



III. C. 34.

1190.

No. 734.


~~1043~~


*Elenchus  
Poeseum*


*Causae morborum, aliaque  
Momenta, in qua medicus  
clinicus inquinere debet. p. i*

<i>morbi Capitis . . . . .</i>	<i>p. 8</i>
<i>Cephalalgia . . . . .</i>	<i>p. 12</i>
<i>apoplexia . . . . .</i>	<i>p. 22</i>
<i>Paralysis . . . . .</i>	<i>p. 24</i>
<i>Epilepsia . . . . .</i>	<i>p. 26</i>
<i>Visus Vitia . . . . .</i>	<i>p. 31</i>
<i>Auditus Vitia . . . . .</i>	<i>p. 39</i>
<i>Dentium Vitia . . . . .</i>	<i>p. 43</i>
<i>Pectoris morbi . . . . .</i>	<i>p. 45</i>
<i>Tussis . . . . .</i>	<i>p. 53</i>
<i>Asthma . . . . .</i>	<i>p. 56</i>
<i>Catharrhus suffocans . . . . .</i>	<i>p. 60</i>
<i>Rauco . . . . .</i>	<i>p. 61</i>
<i>Palpitatio Cordis . . . . .</i>	<i>p. 61</i>

Lypothomia et syncope . . . . .	p 62
Oesophagi morbi . . . . .	p 64
Abdominis morbi . . . . .	
Digestio laesa . . . . .	p. 66
Singultus . . . . .	p 76
Cardialgia . . . . .	p 77
Colica . . . . .	p 79
Fleus . . . . .	p 83
Alvini fluxus . . . . .	p 84
Lienteria . . . . .	p 88
Coeliacus fluxus . . . . .	p 88
Cholera . . . . .	p 91
Dysenteria . . . . .	p 92









# ENCHIRIDIUM MEDICUM

*D. J. Samuel John 314*  
AUTORE  
JOHANNÆ KÆMPF

M. D. SERENISS. LANDGR. ET PRINCIP.  
HERED. HASS. & C. ARCHIATER ET CON-  
SIL. AULIC. SOCIETAT. ACAD. SCIENT.  
PRINCIP. HASS. ET SOCIETAT. PATRIOT.  
HASSO HOMBURG. REGIÆ SUEVIC.  
INCORPORATÆ SOC. ET HUIUS  
SUBDIRECTORE.



FRANCOFURTI & LIPSIAE  
EX OFFICINA GARBIANA  
MDCCLXXVIII.

*AD. 41.*

55



№ 89/53/7

ML

# ENCHIRIDIUM MEDICUM

AUTORE

JOHANNE KÆMPF

M. D. SERENISS. PRINCIP. ARAU-  
SIENS. ET NASSOV. ET SERENISS.  
PRINCIP. LANDGRAV. HASSO HOM-  
BURG. CONSILIAR. AUL. ARCHIATER ET  
CONSIL. AULIC. PRIM. SERENISS. LANDGR.  
ET PRINCIP. HERED. HASSIÆ &C. SOCIE-  
TAT. ACAD. SCIENT. PRINCIP. HASS. ET  
SOCIETAT. PATRIOT. HASSO HOMBURG.  
REGIÆ SUECIC. INCORPORATÆ SOC. ET  
HUJUS SUEDIRECTORE.

---

*FRANCOFURTI & LIPSIAE*

EX OFFICINA GARBIANA

MDCCLXXVIII.

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS INSTITUTION IN 1660 TO THE PRESENT TIME

BY JOHN HENRY MADDISON

ESQ. F.R.S.

LONDON: PRINTED BY RICHARD CLAY AND COMPANY, LTD.

BUNGAY, SUFFOLK, ENGLAND

1926

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS INSTITUTION IN 1660 TO THE PRESENT TIME

BY JOHN HENRY MADDISON

ESQ. F.R.S.

LONDON: PRINTED BY RICHARD CLAY AND COMPANY, LTD.

BUNGAY, SUFFOLK, ENGLAND



## PROOEMIUM.

**E**nchiridium hoc, jam diu in privatos ut & tyronum usus conscripsi. Nunc emendatum paululum, publici juris facere non hæsito ; quam sine cortice nucleus, utile tamen spero, evolvendi, consulendi & memoriam sublevandi scopo, & acceptum. Continet præcipua, causas, diagnofin & curam concernentia momenta, pure quidem practica, Medico clinico scitu summe necessaria, ex innumeris fide digniffimis observationibus, in tot scriptis inclutorum auctorum difperfis, & hic illic in commentariis &c. fparfim noratis, haud parvulo labore collecta, digefta & laconice designata, beati patris, practicotati, chariffimi fratris, feliciffima praxi clari, propriaque experientia probata, aucta. Diligentiffimæ *in cognofcendis & expifcandis caufis* feifcitantioni ; acuendo ad *rectius diftinguenda* iudicio, & *potenti in agendis paucitati*, ceu maximi ponderis momentis & axiomatibus, hancce elaborationem fuper-  
\* 2 ftrue-

fruere conatus sum. Per magnæ causarum multiplicitati divina fere memoria impar est. Huic succurrendi gratia, causas curiose collectas, in certas classes, secundum notam illam Boerhaavii mentem redegî. Tabulam hanc, causas morborum sistentem, opusculo ideo præfixi, quia methodus, medendi cardo, in clara earum notitia vertitur. Multas adjeci, quæ rarissime obveniunt, & quæ gravium quanquam pathematum origines, minutissimæ vero apparentes, toties negliguntur, vel prætermittuntur indagando in altiora: Exhortatus exemplo convulsionum, quas vidit Boerhaave, ex capitis infantis constrictione, ex acicula tenelli cuti infixâ: gravissimæ ophthalmiæ, Morgagni, ex ala muscæ ad corneam adglutinata vix tandem animadversa. Uti & ipse vidi & sanavi, sublata causa, affectum soporosum ex pedum sudoribus retroactis; cephalalgias fat rebelles, ex intermisso usu consueto pulveris peti, ex nimia collaris strictura, ex carbonum doloso halitu in hypocaustis, pedes refocillantium, vel infusum Thee sorbillantium: marasmm senilem ex subito nimis prohibito abusu spiritus adusti, qui per annos

annos antea in deliciis fuit; lumbares dolores antinephriticis & hæmorrhoidalibus remediis diu, male tractatos, ex nixu, quem ocreæ angustiores causerunt: valetudinarios obstrictam & mollem nimis diætam. Inter causas, sæpe occultas, infarctus viscerum abdominis, potissimum numerandi, qui crebrius, quam vulgo creditur, mihi quotidie obveniunt, & de quibus in curatione morborum chronicorum & acutorum semper cogitandum. Maximam navavi operam in colligendis & sollicitè discernendis signis, & feligendis aptandisque, quæ cuilibet speciei quadrant, remediis. Hæc ut unico intuitu perlustranti undique pateant, in brevissimum, ideoque incomtum sermonem contrahere studui. Disparēs varias morborum inutiles denominationes, de quibus auctores sæpe discrepant, illasque morborum definitiones, quæ diagnosin minus illustrent, omisi; & repetitiones, quas rei gravitas non postulat, vitavi. Brevitatis necessitate coactus, auctorum, quorum aratro solum perstrinxi, nomina, invitæ silentio præterivi; eorum ipsissima, quantum fieri potuit, verba quamquam studio retinuerim. Mor-

Morbos, qui maximam affinitatem habent, uti cephalalgia cum reliquis morbis capitis, sub uno titulo pro exemplo normaque reliquorum, fusius elaboravi; iis vero momentis, quæ cui-libet specifica sunt, non defui adjiciendis. Vix ullum remedium simplex aut compositum mandavi, quod non crebriori usu expertorum practitorum, vel propria experientia probatum fuerit. In his recensendis simplicitati studens raro proluxior fui. Sunt vero morbi, e. g. hypochondriacum malum, phthisis &c. qui formularum mutationes & variationes exigunt; & idem malum, e. gr. lues venerea, non semper eidem remedio, quamvis huic specifico cedit, alteri auscultaturum. Quando decoctorum vel infusorum compositiones, plura simplicia ingrediuntur, non eo scopo factum est, ut singula simul adhibeantur.

De nonnullis remediis, nuper celebratis, ideo mentionem non feci, quia eorum determinatus effectus nondum sufficienter constat; alia vero, quorum virtutes (ut cl. Spielmanni, viri ab omni præjudicio alieni verba, mea faciam) a nube testium non levium confirmatæ sunt, quamvis a nonnullis frustra adhibita



bita, ab aliis vituperata & damnata fuerint, optimo jure hic locum inveniunt.

Sic dicta venena potissimum puto ab illustribus de Stoerck, in plus quam mille & mille miserorum mortalium solamen & salutem versa. Ipse herbæ anagallidis flore puniceo, tempore solstitii æstivi collectæ, cum herba alfines non commutatæ, vetustate non corruptæ, & rite usurpatæ vires ad hydrophobiam vel rabiem post morsum canis &c. vere rabidi præcavendam, immo ipsum paroxysmum mitigandum efficacissimas specificas, nec unquam fallaces, in innumeris fere casibus, tam ac testis, quam ac Medicus, totis pagis succurrens, læte expertus sum; quamvis aliis minus efficaciæ visa fuerit.

Unde quæso hæc discrepantia? Diversa forsitan plantarum patria & solum, admodum diversam ipsi imprimunt vim. Diversum clima ægroti temperiem immutans; mali sæpe non satis cognita complicatio; botanices ignorantia inde e.g. cicutæ virosæ & chærophylli bulbosi cum conio maculato commutatio; fraus quorundam pharmacopolarum, & impia negligentia, qui quid pro quo, saltem vetusta obsoleta vendunt, & medica-

dicamenta non curate præparant; medicaminum incongrua dosis & adhibendi modus, vel non continuatus usus; ægroti idiosyncrasia, morositas, ignavia, tædium, inconstantia, fiducia & requisitæ curaturæ (quæ in nosocomiis miræ facit) defectus. Hæc singula vires optimi & specifici remedii infringere, nec non in nocivum invertere valet. Concurrent novitatis odium, pruritus contradicendi, animositas, & præjudicium tam contra, quam pro, quo virtutes infallibiles ac de divino universali remedio exspectant. Auctorum dissensum, imprimis circa medicamentorum effectus in certis morbis, inter se, nec non cum propriis observationibus conciliare annis sum. Formulas mihi familiares, aliasque non omnibus notas, in enchiridio citatas, sub finem invenies, Benevole Lector! Mox & alteram Enchiridii partem, huic multo compendiosior, quæ in febribus versabitur, in lucem mittere liceat.

Ne tædeat nimis jamjam prolixitatis in opusculi fronte, Vale!


Dabam Hanoviæ 1778.


CAUSÆ


Errata typographica, Autoris per absentiam  
quæ eripere B. L. sic emendabit.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
1. 2. lege: quæ.	214. 17. l. calculis.
- 15. l. quantitate.	218. 14. l. inflatio.
2. 21. l. ære.	- 32. lege: specier.
- 26. l. semine.	219. 23. l. retropressis.
6. 9. inter <i>cancro</i>	220. 29. l. fenn.
& <i>necrosi</i> ponatur comma.	221. 13. l. $\zeta$ iiij.
6. 20. post <i>otium</i> deleatur comma.	- 18. l. fanton.
18. 14. l. uvulæ.	222. 10. l. maris.
88. 17. l. laud.	- 15. l. guttæ.
110. 9. l. a gr. j.	223. 2. l. lenia.
152. 22. l. pulveris.	- 16. l. atrophæ.
164. 4. l. anodinis.	225. 1. post <i>lauri</i> adde (Baccæ lauri prius.
193. 25. l. Sydenh.	- 3. l. alkolifat.
- 28. l. tussim.	- 4. l. exhibantur.
194. 17. l. fissuris.	- 18. l. supparest.
200. 6. l. lentor.	- 26. l. calomel.
202. penult. l. falis.	- 34. l. hrb.
- ultim. post <i>infus.</i> adde: menthæ.	226. penult. l. vim.
205. 9. l. laxatio.	227. 9. l. quæ.
206. 18. l. flatus.	- 25. l. recentium.
207. 6. l. diætæ.	228. 14. l. insipidis.
- 27. l. alkolifatorum.	229. 6. l. saponem.
212. 3. l. lycopodii.	- 24. l. grosso.
- 29. l. ceras.	231. 13. l. alkolifati.
213. 31. l. maculæ.	232. ultim. l. transportaretur.

Ob temporis angustiam nonnulla errata forsitan prætervisa sunt, permulta vero inter punctio- nis & sectionis adnotare non licet.









## CAUSAE MORBORUM.

*Aliaque Momenta, in qua Medicus clinicus inquirere debet.*



I)

**INGESTA.** a) Alimenta, cibi peccantia, qualitate acri, salina, acida, austera, alkalescente, muriatica, aromatica, pingui, rancida, viscida, glutinosa, dura, sicca, fermentescibili, flatulenta, relaxante, obstipante; defectu, copia, varietate sibi contraria, avidius, vix masticata, sub animi & ingenii laboribus, potissimum ab infirmis deglutita. Voracitas post morbum aut inediam. Annonae caritas. Panis non bene cocti & fermentati, mucidi, calide ex furno extracti usus &c.


b) Potus qualitate, quantitate, defectu nocentes: Abusus spiritus fermentati, ardentis, aromatizati, empyreumatici; vini vilioris, ex uvis immaturis, austeri, crassi, crudi, tartarei, vapidi, vaporosi, nimis sulphurati, fermentantis; cerevisiae male coctae, non defaecatae, acescentis vel


ex frumento humido pptae; non minus aquae gravioris, durae, impurae, particulis heterogeneis, calcareis &c. refertae, tepidae, Thea, Coffe &c. impraegnatae.

c) Venena & veneni vim habentia. Venena acria corrosiva, acida alkalina, narcotica, coagulantia, styptica, incrassantia, dissolventia, incognitae naturae & singularis in certas partes agendi effectus, ex tribus regnis desumpta: Veneni vim exferentia & sub medicamentorum & alimentorum titulo oblata: Tinctura antiphthifica gramanni, antihecticum Poterii; cathartica drastica &c. &c. medicamenta male adhibita; purgantia, vomitoria, instante mensium fluxu, post animi agitationes vehementes; eorumque nec non mercurii & Guajaci usum excipiens refrigeratio; Potus frigidus post iram, vel corpore calente; vina lithargyrio fucata, cerevisia soporiferis alterata, aqua putrida, stagnans, infectis scatens, alimenta in vasis aeneis, plumbeis diu servata, cucumeres aere inquinati, panis ex fecali cornuto, rubiginoso pptus gypso &c. corruptus; carnes animalium aegrotantium, vel ex morbo mortuorum; olera, fruges, fructus horaei, rubigine, ovulis, excrementis insectorum conspurcata; cum seminae raphanistri, lolio temulento &c. mixta, fungi, mytuli venenati; pulvis peti in capsulis plumbeis diu servatus.

d) Aër nimis frigidus, calidus, siccus, humidus, rarus, densus, subterraneus, diu reclusus; miasmate, vaporibus noxiis, ovulis insectorum, transpiratione multorum hominum, fumo, vapore carbonum, candelarum, potissimum extinctarum, liquidi fermentantis, metallico plumbi, mercurii







curii, floris calcis vivae, sulphuris, arsenici, narcoticorum, aliorumque venenorum, exhalationibus paludum, post fluminum inundationes, tempestates pluviosas, partium animalium putrescentium, coemeteriorum, cloacarum, plantarum alkalinarum putrefactarum, lini & cannabis in aqua maceratorum refertus, aliove modo corruptus, in scholis, nosocomiis carceribus, fodinis, puteis, cubiculis, depressis, humidis, haud ventilatis. Huc quoque pertinent venti a regionibus insalubribus venientes.

2) **GESTA** a) Motus muscularis nimius fortior, statim post cibum sumtum & post quietem diurnam, in aëre calido institutus.

b) Quies nimia; otium vel vita sedentaria.

c) status, sessio; decubitus singulares.

d) Vigiliae, lucubrationes protractae.

e) Somnus immoderatus in aëre impuro calido arcte concluso; sub decubitu supino decliviori, statim a cibo sumto; ventre repleto.

f) Animi pathemata, indignatio vindictae cupiditas; amor, moeror, iique compressi, averfatio, metus, terror, inprimis quos morbi contagiosi inculcant, auri sacra fames, Zelotypia, Philantia excedens, scrupuli circa religionem, gaudium magnum, improvisum; quorsum quoque meditationes profundae, abstractae & imaginatio vivida, sive Enthusiasmus pertinent.

3) **EXCRETA** nimia quantitate. Lympha, serum, mucus, sauguis, lac maternum, per evacuationes morbosas, alvi fluxus, sudores, diabeten, haemorrhagias &c. per artificiales improvi-

de ac intempeſtively inſtitutas, purgantia, diuretica, ſudorifera, Venae ſectiones &c. ſaliva per malam conſuetudinem, tobaci ſuccionem, mercurii uſum, affectum hypochondriacum, ſemen per pollutiones, veneris abuſum potiſſimum pramaturum & onaniam, liquidum nervorum per pleraſque has evacuationes, inprimis ſeminis & per Cs. gener. 2. a - d - & f.

4) RETENTA *b*) faeces alvinae, (vide Alvi obſtipationem) lotium, (vide urinae difficultates) ſemen, in laſcivis, vividae imaginationis hominibus; tranſpiratio, ſudor; manationes ſeroſae, mucoſae, narium, in coryza, Tabaco abuſus, aurium, oculorum &c. fluor albus, Gonorrhoea, Dyſenteria pluresque aliae evacuationes conſuetae aut criticae ſalutares ſufflaminatae.

*b*) Menſes, haemorrhoides aliaeque haemorrhagiae ſuppreſſae; lac repulſum (vide morbos puerperarum & lactis metaſtaſes.)


*c*) Artificiales, conſuetae evacuationes neglectae.

*d*) Febres intermittentes, pramature cohibitae, acutarum criſes turbatae.

*e*) Cutis deſoedationes, ſcabies, gutta roſacea, herpes, tinea, eryſipelas, parotides, bubones, exanthemata retrograda, repulſa, fonticuli, ulcera conſolidata.

*f*) Arthritis, Podagra, oedema, ſudor manuum, pedum, ſubaxillaris retrogreſſa, retroacta. Huc faciunt, refrigeratio, Veſtimenta leviora, vere & autumnſto geſtata, animi agitatio, terror &c. evacuationes naturales, artificiales excedentes,  
intem-





intempestivae, vires fractae, opiata, saturnina sulphurata &c. in- & externa.

5) **APPLICATA EXTERNA** a) aëris injuriæ, subitaneæ mutationes; calor interdiu intensissimus, subsequente nocte frigida. vide Nro. 1-d Insolatio.

b) Balnea calidiora, imprimis post iram, frigida, atmosphaera humido frigida in locis subterraneis, quibus calens corpus immissum.

c) Venena in Unguento & Empl. Cingulo &c. præcipue partibus vulneratis, excoriatis, exulceratis apta. Viperæ &c. ictus, lanceola corpori impuro prius apta; nidor carbonum ex batillis suppedalibus illis ascendens.

d) Violentia externa, vulnerans, contundens, erodens, adurens &c.

e) Vestes angustiores; unde venarum jugularium compressio per collare, viscerum thoracis & abdominis per loricæ illas rigidas, arctiores.

f) Odor gravis, crebrior narcoticorum, spirituosorum, aromatum, florum, aquarum odoriferarum &c.

6) **PLETHORA** vera, spuria, universalis, particularis, vel topica.

7) **SANGUIS** nimis tenuis, aquosus, debilis ex mollitie, regimine, diæta strictiore; abusu tepidæ, fructuum horæorum, vegetabilium, potissimum enascens; unde auctior transpiratio, sudor, urina; foex alvi liquida, corporis infirmitas, nervorum mobilitas &c.


8) SANGUIS nimis spissus, glutinosus: unde circulationis, se- & excretionis segnities, impedimenta, infarctus.


9) CACOCHYMIA VARIA biliosa alkalescens subputrida, acida, vapida, atrabilaria, muriatica, scorbutica, scabiosa, scrophulosa, variolosa, morbiliosa, miliaris, erysipelacea, arthritica, venerea, cfr. Nro. 4-e-f. pituitosa, aliusque naturae incognitae, puogenesi, cancronecrosi, insectorum generationi, antipathiae &c. lenocinans, rarefaciens, coagulans, dissolvens, refrigerans, calefaciens, mira procreans.

10) DEBILITAS FIBRARUM redundantia liquidi aquosi; oleosi, mucosi, imbutarum, juncta sensilitate, mobilitate nimia, vel interdum justo minori, haereditaria, congenita, acquisita per Nro. 1. 2. 3. 7. potissimum per venerem praemaruram; educationem mollem, mores & phantasiam a juventute depravatas; per vitam sedentariam, voluptuosam, vel otium, corporis & animi agitationes, praecipue celatas; balneorum tepidorum & remediorum intempestivum usum; venena quaedam, morbos, dolores, convulsiones, spasmos diuturnos, partus laboriosos, evacuationes &c. praegressos; unde ex levi causa anomalia motuum, ataxia spirituum & sensibilitas mire depravata.

b) Irritabilitas nimia fibrarum magis siccarum, rigidarum, juncta nonnunquam debilitate, ex humoribus phlogisticis, biliosis acribus; post abusum ingestorum spirituosorum, vasa nimis distendentium, aromaticorum, acrium; post animi pathemata vehementiora, vigilias, jejuni-um protracta &c. unde proclivitas in febriles motus







motus &c. haec species Climati & temperamento calido sicco potissimum familiaris est.

11) DISPOSITIO HAEREDITARIA.

12) AETAS, SEXUS, TEMPERAMENTUM.

13) CONSUETUDO, IDIOSYNCRASIA ANTIPATHIA, vel Individui singularis constitutio & dispositio: unde rerum non naturalium, ejusdem medicamentis, veneni, contagii, tam diversa & sibi contraria operatio; e noxiis euphoria, ex innoxiiis laesio &c.

14) CONTAGIUM.

15) Non raro mirorum Phænomenorum & fonticorum symptomatum morborumque causae medicum fugiunt, quas in sequentia, aliaque innumera, ob levitatem apparentem toties neglecta momenta, attente inquirens, difficile quidem deteget. Viscerum infimi ventris infarctus qui multo crebrius, quam vulgo creditur, clandestinas insidias struunt; glandularum meseraicarum obstructions; molimina haemorrhoidalia, vermes, mucus, saburra primarum viarum, interdum latentia & maxima ventriculi & intestinorum cum sensorio communi ad finitas; aliaeque sedes morborum, ob partium vicinitatem &c. occultae in dissitis partibus functiones turbantes; uteri prolapsus, herniae saepe celati: Erysipelas retrogradum, inopinato apoplexiam &c. inducens, arthritis anomala, lues venerea & purpura chronica mire larvatae; stillicidium sanguinis per nares retentum, repressum, & lotii excretio imminuta: hymen anusque imperforata; calvariae neonatorum depressio, facile praetervisa; sensibilitas & mobilitas illa immoderata, en-

thusiastica fere, hodie magis magisque solemnis, (Empfindsamkeit) unde ex levissimo stimulo motus vitiosi, ob nervorum sensibilium consensum mirifice propagati; perversae phantasiae, & alta mente repostae curae: Anteaetæ vitae genus, quoad minimas circumstantias quidem; ejusdem nimis aequabilis mutatio in priori contrariam e. g. laboriosi in otiosum subitanea: morbi perpeffi, eorum medicatio imprudens; morborum exitus & transitus; erroresque aegrotantium, in usu remedi-  
 orum, in Diaeta & regimine & iisdem nimis strictis commissi: pathematum opificibus familiarium origo; anni tempus, loci climatis vel aëris, aquarum, exhalationum &c. peculiaris conditio & influxus; virus febris intermittens, innumeros morbos periodicos procreans; genius morbi endemii, imprimis epidemici, toties mutabilis, ejusque tam obscurum imperium in intercurrentes & subsequentes morbos. Unde horum phases peculiare, de cubitus certas partes occupantes, & consuetæ salutaris medelæ inefficacia; unde abortus, hæmorrhagiæ, apoplexiæ &c. epidemice quasi grassantes; unde forsitan novorum morborum genesis; aliorumque morborum complicatio intricata. Huc refer morbos imaginarios & simulatos, de quibus non raro uti de graviditate celata curiosius cogitandum est.

## MORBI CAPITIS.

*Causae tam idiopathicae quam sympathicae.*

1) Cerebrum concussum, pressum, irritatum læsum, per violentiam externam, casum ab alto; ictum, bombardæ explosionem; sternutationem  
 for-

fortem &c. cranii malam conformationem; depressionem, fracturam, festucas, excrefcentias, cariem, tam simplices quam venereas: per fangulnem extravasatum, feri colluviem, metastasin febrilem, inflammationem, pus, faniem, ulcera, hydatides, tumores gypseos, osscos, steatomatosos, per aerem pr. nat. evolutum; mercurium eo delatum. An per Vermes?

2) Cerebrum pressum; irritatum per repletionem nimiam vasorum encephali, a sanguine rarefacto, phlogistico; polyposo impuro, acri, post evacuationes retentas sanguinis & feri, nonnunquam lotii; ob viscerum obstructionem; obesitatem; tumores, vasa thoracis aut abdominis comprimentes (cfr. Csas. gener. Nro. 4. 9. & 15.) Multaeque aliae Causae huc pertinent, quae sanguinis affluxum versus Caput promovent, aut refluxum impediunt. (vide Csas. gener. Nro. 1. d. & Nro. 5.) Quibus Cerebrum eo magis & facilius afficitur, quo major ejus debilitas & sensibilitas est, aut nativa aut per meditationes profundas; animi agitationes; crapulas; veneris, narcoticorum abusum &c. acquisita.

3) Filamenta nervosa cutis capitis & membranac Schneiderianae male affecta. Illa per contusiones; vulnera, imprimis minora, citius consolidata & ulcera inde nata; haec per vermes, in sinibus frontalibus nidulantes, & mercurium ibi collectum, haemorrhagiam narium, perspirationem, coryzam suppressos; mucum induratum; lapillos &c. &c.

4) Systematis nervorum debilis, senilis, hysterica & hypochondriacis inagis familiaris, (cfr. Csas. gener. Nro. 10. & 11.) Commotio, stimu-

lus, per animi pathemata; imaginationis vim; inprimis per terrorem vel moerorem & iram compressos, amorem celatum; per applicata externa (cfr. Csas. gener. Nro. 5.


5) Ejusdem pressio, tensio, vellicatio, in variis visceribus, thorace, renibus, hepate, utero, &c. &c. crebrius vero in ventriculo & intestinis, per saburram viscidam, acrem, fermentantem, flatus, vermes, venena; (cfr. c. gener. Nro. 1.) per bilem corruptam aeruginosam; mox irritationis causam, mox effectum; per alvi obstipationem &c. &c.


6) Mitiores Capitis morbi saepe recrudescentes, e. gr. Coryza, Cephalalgia habitualis: qui facile in graviores, in apoplexiam &c. &c. transeunt.

7) Inanitio vasorum & defectus spirituum, post haemorrhagias aliosve morbos enervantes; ab usum veneris &c. praegressos (cfr. Csas. gener. Nro. 3.)

### *Methodus medendi generalis.*

Evacuantia; derivantia; revellentia; purgantia, rarius emetica; diuretica, sialogoga, errhina, clysmata, venaesectiones in brachio, vel pede dein jugulo; scarificationes narium, occipitis profundae, cruorem ex sinibus lateralibus elicientes; hirudines circa tempora, post aures, ad anum; Cortex Cocognidii, aceto maceratus brachiis, Betæ folia; Vesicatoria parti praecedenter affectae apponenda ipsique capiti, post ulcera ibi exsiccata: vel haec suris admovenda (Emplastr. vesicat. cum una aut altera parte Empl. hyosciami,







mi, & pauxillo Camphor. miscetur; semper tamen, ex tempore, notabili portione pulveris Cantharidum, subtilissime triti conspergitur & cuti, antea ad rubedinem perfricatae & spiritu vini absolute aptur. Vesica inde excitata, provide aperta, atque cuticula remota, vulnus Unguento ex Ol. ovorum ℥vj Sperm. cet. ℥ij Cerae albae ℥j ter de die deligatur, vel folia heder. arbor. imponuntur.) Fonticuli in continuatione futurae temporalis vel petrosae inusti; Seracea; manu & pediluvia tepida, profunda, interdum balnea, epithematibus frigidis capiti simul impositis, praemissis frictionibus; subjunctis sinapismis, vel Empl. de Galban. cum salis cornu Cervi & pulveris Scillae pauxillo, ad plantas pedum. Decubitus elevato capite, pedibus pendentibus; & cataplasmatibus, Decocto Althææ tepido, crebro irrigandis inferioribus circumdatis; Vapores Capiti admissi, naribus hausti; Cataplasmata, fomenta, capiti appda. Quandoque ad scalpella chirurgica, trepanationem deveniendum. Porro cacochymiam variam corrigentia, diluentia, demulcentia ad sua loca invitantia; splanchnica; menstrua & haemorrhoides provocantia; stomachica; antidota; anthelmintica, antiferophulosa, antihysterica, antihypochondriaca, antiphlogistica; bilem corrigentia, Cephalica vel sic dicta specifica - antiepileptica, nutrientia, roborantia, raro opiata. Quænam vero ex his remediis in determinato casu, prae caeteris conducant, quænam obsint, ex Phaenominis conjunctis, ex aegri temperie, ex Causarum antecedentium historia, prudens Medicus prudenter determinare conabitur & simul *Causarum occasionalium* sollicitam evitacionem inculcabit: Quo pertinent *Lacis*


*Splen*


*splendor, sonitus, odor gravis; lectio intenta; meditatio profunda, respiratio praepedita, tussis, vociferatio, vomituritio, nixus, status, sessio, decubitus sanguinem versus Caput determinantes & in eo retardantes; somnus pomeridianus; motus nimius, aer impurus, calidus in cubiculo &c. solis radii; nidor carbonum, halitus fermentantis liquidi, vapor domiciliæ calce recenter incrustati, collare aliaque vincula nimis stricta; mitra densa, gravis; alvus obstipata; pedes frigidi; ingluvies, inprimis inebriantium & coena opipara Ventriculum onerans, distendens; venus; animi agitatio; Idiosyncrasiae cognitæ inimica, vel ingesta vel apta. (cfr. Csas gen. Nro. 2.)*

## CEPHALALGIA.

Causas & methodum modendi generalem vide sub morbis Capitis.

Externa sequentia ad plurimas Cephalalgiae species accommodata sunt. Capitis abrasio, fricatio, ablutio cum oxycrato, ligatura: Epithema frontale & fomentatio frigida totius Capitis ex Infus. flor. arnicæ sambuci, rosar. rubr. & pauxillo sem. cumin. contus. ℥v. Aceti rutac. ℥ss. nitri ℥ss. Salis ammoniaci crudi ℥j pptā. An verbena collo appensa & ejus aqua destillata cum Spiritu Vitrioli mixta interne adhibita? Empl. de ranis cum Mercurio, ad tempora; linimentum ex Oleo hyosciami Ess. Galbani Bernhard. inspissata & spiritu salis ammoniaci compositum; spiritus aethereus cum Camphora ad Verticem, tempora & locum dolentem; vapor oxycra-







oxycrati capiti, naribus admissus; succus Betae, hederæ terrestris cum quadruplo aquae rosar. dilutus & liquore anodyno minerali mixtus, naribus adtractus: hirudines pone aures; rube-faciens adjuncturas brachiorum. R. Empl. oxycroc. p. ij galbani p. i. adde olei succini aliquot guttulas; vel epispasticum ex fermento panis succo ceparum & Baccis Juniperi contus. cui pro renata oleum destillatum majoranae & spiritus salis ammoniaci vinosus addi possunt; plantis pedum & poplitibus, praemissis frictionibus & pediluviiis *adpta*; enemata quotidiana, interdum Balnea tepida.

*Curam specialem Cephalalgiae Sanguineae* cognoscendæ ex temperie calida, plethorica; facpius ex motibus febrilibus; faciei, oculorum rubore; vasorum inflatione; narium, oris siccitate; pulsu frequenti, fortiori in rarum tandem abeunte; urina rubra; ex praegressis, victu lauto, vinoso; balnei calidi usu; exercitio immodico; pathematibus animi gravibus; insolatione; evacuationibus sanguinis intermissis, cohibitis (vidæ Csas gener. Nro. 10. b.) absolvunt: venæ sectio larga, prius in pede aut Brachio, deinde in jugulo instituta; cujus reiterationem, plethora, pulsus plenus durus & celer indicant; fomentatio frigida ad Caput supra descripta, cum pediluviiis tepidis simul adhibitis; scarificatio occipitis, narium, praemisso inspiratu vaporis emollientis (summe necessaria, si narium haemorrhagia aut suppressa est, aut instat) hirudines circa tempora, pone aures Nro. X-XII. eae in molimini-bus haemorrhoidum ad anum; ligatura supra genua; sinapisimi, post fatus pedibus adpti; cathartica antiphlogistica, Tamarindi, Cassia; Electuar,  
Tar-

Tartarifatum; Cremoris Tartari continuatus ufus; Magnesia cum fucco citri bene faturata. R. Conſervae Acetofell. ℥j. Pulpae Tamarind. ℥ſſ. Spirit. Vitriol. q. s. ad gratum acorem, Syrupi Citri q. s. ut fiat Electuarium. Potatio larga, frigida feri lactis, radice gramin. Tarax fragar. ſaponariae, herbae Borag. Buglofs. Bellid. min. Acetofell. Chaerefol. Agrimon. fumariae, Scolopendrii & ſimilibus alterati & Syrupo de Cichor. edulcorati; ejuſmodi Ptifanae oxymelle, fucco Citri vel Elixir Halleri acidulatae &c. aliaque refrigerantia in & externa. Clysmata tepida ex Decocti rad. Althaeae ℥x. Nitri & pulveris radice Scill. aa. ℥j. ppt. dein emollientia, ſine ſtimulo, crebro appta & quamdiu fieri poteſt, retenta. Diaeta tenuis, blandiſſima, magis vegetabilis ſuadenda, inprimis acetaria ex lactuca Borag. &c. Situs erectus, pedibus pendulis; Caput denudatum; quies ſumma. vide Cſas occasionales evitandas, ſub MM. gener. deſcriptas. Fibrae ſicciores & humores acres, remedia magis relaxantia, & demulcentia, lacticia copia &c. nec non Balnea tepida; Haemorrhoides, Menſes &c. ſuppreſſi, remedia fluxum leniter revocantia, Clyſteres viſcerales, cataplaſmata ad abdomen, Balnea hirudinesque ad anum &c. (vid. ſub obſtuctione viſcerum) expoſcunt. Omnes concuſſiones & Vomitorio excitatae, ſpiritus odoriferi, aliaque ſtimulantia hic locum non habent.

CEPHALALGIA PITUITOSO - SEROSA, ex temperie frigida, pituitoſa; facie magis pallida; palpebris tumidis; oculis &c. humidis, pulſu debili, languido, extremis frigidis, ex praegreſſis, vita otioſa, mora in aere humido, frigido, evacuationibus








nibus pituitae per nares & fauces & feri viscerum per alias vias; iisdemque suppressis, oedemate pedum &c. retro gressu suspicanda est.


M. M. Purgantia, helleborata, mercurialia, noduli laxantes amari, interdum vomitoria; Vinum Huxham. tandem parvis dosibus, Clysteres acriores, Vesicatoria, Setacea, fonticuli, Rubefaciens cuti huc & illuc infricandum. ℞. Ungt. Pomad. ℥ij Pulv. Cantharid. ℥ij ms. -- Itamersio Brachiorum ad cubitum usque & pedum in aquam sat calidam, frictione sub aqua simul instituta; Emplastr. suppedale mitius Boerhavii; sinapismi: ℞. fermenti panis, Pulver. Sinapi rec. aa. ℥ij, fol. rut. rec. ℥ij. Salis Gemm. ℥℞. acetici scill. q. s. ms. f. pasta (cfr. M. M. gener. Morbor. Capitis) — Gargarismata ex Decoct. rad. Angel. Pyrethri, Galang. fol. rut. orig. flor. lavendul. ad mixto spiritu salis ammoniaci, vel Oxymelle scillit.; Masticatio Pastillorum. ℞. Ceræ alb. rad. Zingiber. aa. ℥℞. ms. f. l. a Pastill. — Errhina, succus heder. terrestris, Betae, aqua dilutus; pulvis ex herbis cephalicis vel cubebis foliis asari & stro; Sal vol. siccum angl. vel Spiritus Castor. compositus, cum aceto rutae combinatus naribus admota: Interne solutio Tartari emet. cum pauxillo Extr. Capit. Papav. mixta, minutis dosibus crebrius exhibita, Extr. Aconiti, Pillul. scilliticae vel ex sapone antimoniali: Gummi Amoniaci, sagap. Galb. rad. ari rec. Mercurio vivo mucilagini Gummi arab. subacta, compositae. Mixtura ex aqua rutae, lilior. conv. sulphure aurat. Antimon. potabili; Spiritu Minder. Syrup. de Eryfimo, Oxymello scill. conflata: Infus. herb. Arnicae, marrubii alij. Verb.

Verbas Hyfopi. Origani falv. flor. Tiliae Sambuc.  
Arnicae, rorismar. &c.

CEPHALALGIA SEROSA. A sero magis acri,  
tenui, eoque retento aut retroaëto oriunda. (cfr.  
Csas gener. Nro. 4-a-e-f-& Nro. 9.) a non-  
nullis exanthematica, arthritica, &c. nominata.

M. M. Remedia Acrimoniam diluentia, de-  
mulcentia largissime hausta; revellentia, ad sua  
loca invitantia; Cathartica lenia, Antiphlogistica,  
diaphoretica, diuretica, discutientia, Paregorica,  
cardiaca; Emulsio oleosa mannata, Electuaria  
sub Cephalg. sang. descripta &c. serum lactis  
rad. gramin. Tarax. liquirit. fol. fumar. flor.  
Sambuc. & Diacodio alteratum; Decoct. rad.  
Alth. rasur. Sassafr. adjecto roob. Sambuc. cum  
vel sine lactae pptum; Emulsiones camphoratae,  
Infusum falv. flor. Sambuc. Succo citri acidula-  
tum, Succus Betulae, Chaerefol. cum mixtura  
simplici, Liquor anod. min. Hoffmanni cum Spi-  
ritu Cornu Cervi succinat. mixtus, Aether Vitrio-  
li Moschatus; Cortex Peruv. cum Efs. vol. Gua-  
jaci, Pulvis Doweri, flores Sulphuris, Sulphur  
auratum antimonii potabile, vel sapo antimonii  
in liquore Terrae foliatae Tartari solutus. —  
℞. aquae flor. Sambuc. ℥vj. Aceti Sambuc. ℥β.  
Roob Samb. ℥j. ms. D. omni hora Unc. ij - vel  
℞. Aquae flor. Samb. ℥β. Salis volatilis Cor-  
nu Cervi ℥j Aceti q. s. ad saturationem, mellis  
℥β. ms. D. cochleatim. — Inter efficacissima  
& secura militat: ℞. Extr. Aconiti gr. II. Sac-  
chari ℥ij ms. f. Pulvis subtilissi. in sex Doses  
dividendus D. Mane & vesper. una; superingesto  
potu demulcente copioso. Externe manu-pedi-  
luvia,






Invis, præmissis frictionibus, lintea cerata viridia pedibus circumdanda, sinapismi, unguentum rubefaciens, cortex cocognidii, vesicatoria temperata (vide M. M. gener. morbor. capitis & cephalalgie pituitosæ); Insitio scabiei, nonnunquam balnea tepida; semper clysteres emollientes, paregorici, usque resorbeantur retenti. Ex hisce, discutientia calida, cardiaca, quo & opiata pertinent (quæ in concurrente anomalia motuum potissimum locum habent), cum grano salis adhibenda, iisque venæ sectiones reliquaque antiphlogistica sæpe præmittenda & interponenda sunt. In temperie calida, plethorica, febre juncta, in inflammationis metu; doloribus acerbis & in fibra sicca, horum loco curatio cephalalgie sanguineæ, junctis emollientibus, acre involventibus & lenissime expellentibus, in usum vocanda; ea vero lege, ne vires expultrices, venæ sectione nimia & frigidis deprimantur, sed injusto moderamine serventur, & potius subleventur. Aegroti alimentis eupeptis demulcentibus, decocto granulorum sagu, rad. salep. &c. nutriendi (cfr. arthritidis anomalæ curam.) Postea cacochymia varia, propriis suis remediis impugnanda & viscera debilia cortice peruviano roboranda. Diathesis erysipelacea elixirio acido, creinore tartari cicuranda.


AD CEPHALALGIAM a LOTIO IMMINUTO RETENTO R. Spirit. cornu cervi ℥ij aceti scillit.  $\overline{3R}$ . Syrupi de erysim. lob. ℥ij laud. liq. Sydenh. gttss vj-viii ms. D. omni trihorio gttss L. Eclegma, ad tussim catarrhalem ordinatum; Clysteres, potus nitrosus, terebinthina renum regioni affricta, cataplasmata, venæ sectio repetita, catheter, tandem, paracenthesis in perinæo.

**CEPHALALGIA SCORBUTICA.** Ex gingivis laxis, tumentibus, sanguinolentis, ex ulceribus, si quae adsunt, spongiosis, mollibus, in ambitu livescens interpersis punctis albis suspicanda. (reliqua criteria vide sub scorbuto) antiscorbuticis.

**CEPHALALGIA VENEREA.** Ex dolore osteo-  
po, rodente & terebrante, in interiore ossium parte, noctu & lectuli calore exasperato; dolore fixo, in medio pectoris diu perseverante, condylomatibus, anum obsidentibus, ex tumoribus glandularum inguinum, colli, sub axillis &c. Ulcerum, si quae adsunt, conditione; quae in ambitu rubra, mollia, in fundo ex albo cinerea, lardacea sunt; ex ulcerationibus faucium, ovulae, tonsillarum &c. ex maculis duris, parum elevatis, rotundis, rubris cum margine duro, albo, partes corporis superiores occupantibus & in fronte sic dictam coronam veneream formantibus; exostosis, urina crassa, sub turbida, cum sedimento tenaci, quasi grandinoso, odoris foedi, cognoscenda, antisyphiliticis & externe empl. ad ganglia (Dispens. Brandenb.) capiti raso imposito sanatur.

**CEPHALALGIA STOMACHICA,** quae reliquis speciebus crebrius occurrit et cujus diagnosin absolvunt, lingua, dentes fordidi, anima foetida, rictus acidi, nidorosi, rancidi, sapor ingratus, appetitus dejectus, interdum nimius, nausea; Vomitus sordidum, molestiae sensus circa praecordia, anxietas, ventriculus inflatus, phlogoses, tremor labiorum, manuum, dolor artuum, soda, cardialgia, borborygmi, alvi inconstantia, praegressa ingluvies; Vomitoria, purgantia amara, acida. Sedlizenfes exigit (vide reliqua sub digestionem laesa, imprimis ex csa 1ma & 2da). Huc pertinet







tinet *verminosa*, (cujus curam vide sub epilepsia.)

**CEPHALALGIA BILIOSA.** Ex sapore amaro, anxietate, ardore, lingua squalida, anima foetida, nausea, siti, excretionibus biliosis, colore cutis, albugineæ flavescente, urinæ flammeo, croceo; quandoque molesta constrictione, dolore circa hypochondrium dextrum, versus præcordia sese extendente; meteorismo, temperie biliosa, anni tempore, morbis biliosis favente, ipsaque epidemia, ex prægressis animi affectibus, potissimum ira & quacunq; irritatione nervorum vehementiori, hysteriarum & hypochondriacorum dijudicanda. Remedia sub cruditatibus biliosis & cephalalgia sanguinea descripta sunt. Vide ibidem electuaria; & serum lactis frigide & copiosius sumendum.

**CEPHALALGIA STOMACHICA GRAVIS.** Post partum copiosum dyspeptorum fermentantium, flatulentorum apoplexiam minitans, cum inflatione & anxietate summa nupta, opem citam exposcit; clysteres acres, potum largum, spiritu sulphuris acidulatum, vomitorium ex radice Ipecacuanh. gr. vj cum tartari emetici gr. I - II. mixtis: quandoque simul venæ sectionem. Interdum vero *cephalalgia ex cerebri concussionem ejusque vasorum lenta & levi obstructione*, eveniens nausea; Vomitu, languore, debilitate summa, pulsuque sæpe inordinato incedit & sordes ventriculi mentitur. Cujus medelam vide sub cephalalgia sanguinea.

**CEPHALALGIÆ, A VENENIS NARCOTICIS;** quoniam NIDOREM CARBONUM refer, quæ ex sensuum stupore, capitis sopore, torpore, interdum agrypnia, deliriis iairis, aliisque morbis capitis, viri-

um languore, dyspnœa, pulsu tardo, depresso, a-pepsia, alvi obstipatione &c. suspicatur, medentur, acida, acetum, succus citri &c. præmissis vomitorio, vel vomitu, faucium irritatione procurato, sæpe venæ sectione; in aëre libero, large fumenda; clysteres ex oxycrato, acres, pediluvia, frictions plantarum cum aceto & sale, acetum rosaceum ad frontem & nares, aceti vapores. NECROSIS ex ejusmodi venenis, fecali cornuto, rubiginoso &c. orta, corticem peruv. cum panxillo opii mixtum, fomenta antiseptica.


CEPHALALGIA A MORSU VIPERÆ alkali vol. & theriac. aa. ℥j vel mercurium mucilaginosum Plenckii, cum extr. gent. r. mixtum; Externe theriacam in vino solutam, vel oleum olivarum: *Ex vino lithargyrio fucato; vapore plumbi &c.* curam colicæ pictorum exigunt.


CEPHALALGIA ATRA BILIARIA, HÆMORRHOIDALIS, UTERINA, SCROPHULOSA; ex alvi obstipatione &c. medendo principi morbo sanatur.

CEPHALALGIÆ, EX NERVORUM SENSIBILITATE, SPIRITUUM MOTU VIIIATO ORIUNDÆ, HINC SÆPE HYSTERICA, HYPOCHONDRIACA dictæ diagnofin & curam vide sub malo hysterico & hypochondriaco. Profuit rad. valerian. pulvis ad ℥j ter de die exhibitus. *Ex inanitione vel defectu spirituum* analeptica blande nutrientia — *Ex doloribus partium remotarum*, otalgia, nephritide &c. Paregorica, clysteres emollientes, venæ sectiones & medelam principis morbi.

PERIODICA ex viro febris intermittentis latente, præmissis evacuationibus, corticem peruv.

EX OBESITATE, abstinentiam, dietam tenuem, macilentam, leniter stimulantem, ex pane bis cocto,  
 affata





assata carne &c. motum corporis modicum; saponis venet. vel & oxycrati largum usum, oxymel. scilliticum, interpositis evacuationibus.

EX ICHORE, SUB CUTIS CAPITIS *densis crustis collecto vel ex ulcere post vulnusculum citius consolidatum*; vulneris amplificationem, ulceris mundificationem.

EX MERCURIO IN CAVITATIBUS CRANII DELI-  
TESCENTE usum largum decocti bardanae, enu-  
lae, & pimpinellae albae, interpositis purganti-  
bus petunt. Interdum spiritus mercurialis Swie-  
tenii in parciore dosi simul adhibendus; qui tunc  
facile salivationem excitabit.

A GRAVEDINE, A MUCO INDURATO in mas-  
sas membranaceas, polyposas, quandoque, con-  
crecente, sinus frontales occupante, vapores ini-  
tio emollientes lactis, decocti majoranae, mal-  
vae; postea succum hederæ terrestris, & seminis,  
nigellae, naribus inspiranda, errhina præcipue  
ex pulvere Hippocastani; cucurbitam parti fri-  
genti verticis superinpositam, ac deinde unctio-  
nem ejus cum oleo succini. *Catarrhalis a tran-  
spiratione suppressa* diaphoretica, demulcentia,  
sub cephalalgia serosa descripta, nonnunquam ve-  
nae sectionem & catharticum lene exposcunt.

STERNUTATIONEM NIMIAM sedat ET CE-  
PHALALGIAM INDE ORIUNDAM SÆPE PERICULO-  
SAM præcavet, lac cum malva coctum, ex cava  
manu, per nares attractum.

CEPHALALGIÆ A NARIUM HÆMORRHAGIA CO-  
HIBITA curam vide sub hæmorrhagia narium.

EX VERMIBUS ALISQUE INSECTIS IN SINUBUS  
FRONTALIBUS HOSPITANTIBUS, qui sternutatione


frequenti, dolore fixo, mordaci, potissimum in apice nasi, ad motum corporis increfcente; narium siccitate, pruritu, odore foetido & vertigine se manifestant, inspiratio pulveris tabaci, fumi ex foliis absynth. marrubii, beton. rad. angel. succino & antimonio crudo, & decocti mercurii vivi cum aqua Anhaltina & syrupo absynth. mixti medentur. *Cephalalgia vehementi gravidarum* cita venæ sectione & repetita, & ex *dentibus cariosis* eorum avulsione, succurrendum.


AD CEPHALALGIAM a CRANII CARIE, TUMORE, OS crebrioribus foraminibus pertundendum. *Ad eam ex causis idiopathicis Nro. I. fonticis.* Evitatis causis occasionalibus, sub M. M. gener. descriptis, tentandum, quid fomentatio capitis (vide M. M. gener. cephalalgia), & æthiops antimonial. ex infuso arnicæ, cardui benedicti & stipitem virid. dulcamaræ, succo heder. terrestris & oxymelle alterato, junctis revellentibus præsent. Tandem post incisionem cutis cruciatam, & hinc longam suppurationem excitatam, ad terebrationem deveniendum. Cephalalgia ob defectum suturarum incurabilis est.

VERTIGO, STERNUTATIO MORBOSA; INCUBI QUÆDAM SPECIES; AFFECTUS SOPOROSI ET CATALEPSIS ex iisdem causis, quæ cephalalgiam excitant, maximam partem enascentes, eandem fere medelam exposcunt. Remedia externa, somnolentos & catalepticos frigidiores excitantia vide sub lipthymia.

## A P O P L E X I A.

Vel subitanea actionum animalium abolitio, ea difficili ac stertorosa respiratione, somno profundis-







fundissimo, pulsu in principio magno & artuum laxitate cognoscenda & distinguenda. Felicius præcavetur, quam curatur. Imminentem præcipiunt vertigo, dolor capitis, inprimis occipitis gravativus; junctis nonnunquam, nausea, conatu vomendi, & vomitu bilioso, æruginoso, a levi capitis motu recrudescentibus, non raro pro vitio ventriculi imponentibus, cui neglecta venæ sectione (quæ momento citius vomitum &c. sedat) & reliquis antiphlogisticis, calida sæpe stomachica damnose opponunt. Porro, turbatio visus, tinnitus aurium, vox tremula, artuum gravitas, tremor, fornicationis sensus, difficilis incessus, somnolentia, somnusque minus placidus, dolores circa præcordia sensibiles quidem, sed fugaces, incubus frequens, faciei, oculorum rubor, physiognomia mire mutata, insolita mentis alienatio, pigritia, memoriæ debilitas, frequentes insultus paralytici, partiales, fugaces & leves. Periculum eo majus est, si hæc crapula venere, studiis, mœrore &c. &c. debilitatis, iracundis, obesibus, catarrhosis, asthmaticis, plethoricis, senibus & causas occasionales supra notatas non fugientibus contingunt.

Hoc morbo semel correptis, tensionis, circa nucham sensus & appetitus mire auctus, insultum intra duos, tresve dies reversurum portentunt, hinc ut ad hæc phænomena attenti sint & remedia prophylactica sine mora in auxilium vocent, sedulo monendi sunt.


M. M. GENERALEM vide sub morbis capitis, specialem sub cephalalgia. Frequentissime apoplexia sanguinea occurrit; sæpe pituitosa, nonnunquam serosa, cum sanguinea complicata, ra-


rius stomachica, ex inanitione vasorum vel spirituum defectu, a venenis &c. &c. idiopathica, epidemica.


## PARALYSIS.


Sæpius apoplexiam insequitur, interdum præcedit, vel absque ea, ex ejus diversis causis provenit, aut ex quibuscunque ingeneratur, quæ cerebrum, medullam, nervos, arterias comprimendo, erodendo, vulnérando & summopere enervando; per ligaturas fortes, tumores frigidos, serophulosos, inflammatorios, spinam bifidam, luxationes, fracturas, ulcera &c. &c., evacuationes ingentes, aliosve morbos fonticos prægressos, spirituum vel sanguinis influxum in partes musculosas præpediunt vel nexum tollunt. Uti apoplexia bene in *sanguineam*, *pituitosam*, *serosam*, *stomachicam*, *iscorbuticam*, *hypochondriacam*, *serophulosam* &c. &c. distinguitur. Hinc eadem fere M. M. locum habet, potissimum in paralyti ex apoplexia nata, eaque recenti. Degenerat enim sæpe adultior in alias species, calida in frigidam &c. Venæ sectio si indicatur, in parte lateri resoluto opposita instituat.

IN PETUOSA, reliquis multo frequentiori, opem ferunt attenuantia, leniter stimulantia, febrem mitem & diarrhœam excitantia, nervina, cephalica, spiritus & sales volatiles, antimonalis, mercurialis, reliquaque remedia sob cephalalgia pituitosa descripta; Sal cornu cervi ad ʒʒ & ultra in aqua fragranti solutum, mane in lecto fumendum & decoctum ligni sassafras, Guajaci vel insusum herb. arnicæ, salviæ,  
roris-









rorismar. rutæ, flor. arnicæ &c. superbibendum, unaque partes affectæ perfricandæ. Conserva millepedum, ætheris vitrioli veri gttas v-x-xx. Pulveris flor. arnicæ ℥ij-ij ex conserva meliss. salviæ pedetentim de die, tinctura vespræ aureæ; spiritus volatilis, oleosus, extemporaneus, ex olei majorani, rorismarini, rutæ aa ʒ β in spiritu vini rectificatissimi ℥ij solut. adjectis spirit. salis ammoniaci dulcific. ℥ij conflat, sic dicta specifica antepileptica. Inter mitiora laudandus spiritus antiscorb. Draw. vel aperitivus Penoti omni triborio ad gttas xv-xx. ex decocto meraco rad. valerian. & fol. aurant. syrup. papav. & oxymelle scillitico edulcorato sumendus: (qui in affectibus tam paralyticis, apoplecticis, quam soporosis, convulsivis ex abusu quidem spirituosorum vel crapula enatis sæpissime exoptatum effectum præstitit) Elix. ex extr. nervino, arnicæ & aqua nervina compositum & ex infuso fol. salviæ, succo citri acidulato propinatum. Externe balnea nervina, Embrosia, vaporosa, embrochæ, fomentationes aromaticæ; emplastrum Galbani, saponatum, de ranis cum mercurio, linimentum ex sapone ven. & spirit. vin. rectific. desuper desagrato adjecta camphora pptum. cum aqua Anhaltina aut spirit. terebinth. aut essentia Galbani Bernh. mixtum, linimentum volatile ex oleo olivarum p. ij. & spiritus salis ammoniaci p. j. conflatum, vel R. Ungti nervini ℥ij pulver. cantharid. gr. xxx. spiritus salis ammoniaci q. s. ut f. linimentum; junctis frictionibus, spinæ dorsi, artubus & juncturis & ex his quedam capiti appda; Vesicatoria magna vel & empl. suppedale mirius Boerh.

ad nuham, si partes superiores, & ad os sacrum si inferiores paralyfi afficiuntur, ignis electricus. Ex his vero calida, acriora interdiciunt, plethora; apoplexia sanguinea recenter prægressa vel imminens; Causæ idiopathicæ fonticæ, irritabilitas nimia, febris & tussis sicca.

PARALYSIS LINGUÆ masticatione eubebarum, oleo cajeput vel liquore anod. min. frustulis cinamomi aliquandiu infuso, sro instill. & sub lingua detento; gargarismate (vide cephalalgiam pituitosam) vesicatorio ad nuham.

PALPEBRARUM inunctione linimenti supra notati cum balsamo vitæ & oleo tartari foed. mixti. *Vesicæ & ejus sphincteris*, unde retentio & incontinentia urinæ: infuso salviæ, femin. anserin. vinoso, adjecto rob. juniperi, enematribus, balneis, injectionibus nervinis, suffitu ex mastiche & succino, vesicatorio, vel empl. melilot. cum Galb. & Sagapen. mixto, vel emplstr. supped. mit. Boerh. ossi sacro, aceto bezoardico, vel uncto sapon. cum comitiss. mixto, linimento vol. pubi & perinæo aptis sanantur. Paralytici affectus periodici aut intermittentes cortic. peruv. superandi. Paraplegia ex lapsu plerumque lethalis est.


## EPILEPSIA.

Quo pertinent vertigo caduca, lipothymix & incubi species &c. cum motibus spasmodico-convulsivis; & motus spasmodici vel convulsivi cum sensuum abolitione invadentes.

*Causæ & M. M.* sub morbis capitis in genere & sub cephalalgia in specie descriptæ sunt.


Et






dia sunt?— Permultos saltem epilepticos tam adultos (ubi nullum acidi indicium fuit) quam infantes, pulveris cochlearum & lumbricorum, (ab aliis, quibus arcano fuit, ordinati) usu sanatos vidi. Unde quæso hæc efficacia?

Inter epilepsiæ species, illæ ex vi imaginationis, terrore, mærore, amore, iracundia & inde bile commota, ex sero acri, corrupto, retro-actò, fluxu sanguinis per nares, uterum &c. retento, cohibito, ex febre intermittente suppressa & veneris excessu crebrius obveniunt: Illa vero a vermibus & mucò sæpe tenacissimo, copiosissimo aliisque sordibus primarum viarum longe frequentissime occurrit. Hæc species vermiformis, pituitosa, præmissis digestivis, mucum incidentibus pulvere nempe stomach. Birkm. mixtura Riveriana, salibus mediis; pilulis ex gummi ammoniaco & bulbo ari rec. vino antimoniato Huxhami a gttis x. ad xl., aqua diluto &c. interpositis anthelminticis, semine scilicet cinæ selecto, a stipitibus aliisque quisquiliis pulverulentis &c. curiosus purgato; Electuario ex mercurio viv. mucilaginoso camphorato; Extr. cort. peruv. & pulvere rad. filicis &c. composito aut ℞. Petrolei veri ℥j Castorei q. s. ut f. pil. gr. iij pond. D. omni quadrihorio pil. iij. nec non stomachicis, infuso nempe vinoso cort. peruv. herb. absynth. fol. & cort. aurant &c. purgantibus repetitis, quandoque vomitoriis oppugnanda. In quem finem conducunt ℞. Pulv. rad. jalapp valerian. salis polychrest. aa ℥j oxymel scillit. ℥iv. ms. D. bis--quater de die ℥℞ ex infuso meraco, fol. aurantior. & herb. spigeliæ, vel pilulæ ex MPill. viscer. cum aloë extr. valerian.






rian. asa foetida, calomel. resina jalapp. & petroleo composita. In malo vero pertinaci bolus, ex mercurii dulcis, sem. cynae aa gr. x-xx & conferv. ros. q. s. conlatus, vesperi, & frequenti mane pilulae purgantes R: extr. cathol. gr. x-xx. scamonii resin. jalapp. aa gr. v. spirit. vini q. s. gumi gutt. grana x-xv. in infuso mannato fumenda; subjuncta aqua mercuriali, & uncto de arthanita aut linimento ex oleo terbinth. petroleo & felle tauri, abdomini illinendo & elysmate ex aqua mercuriali, rad. valer. herb. absynth. flor. chamom. asa foetida, camphora, saponis nigro, oxymelle scill. & similibus alterata, simul adhibitis. Haec vero ea lege praescribenda, ut digestivis cum anthelmintibus & stomachicis per 5-6. dies usurpatis, cathartica demum subjungantur, quae denuo digestiva &c. excipiant; omniaque secundum hunc ordinem repetantur, quam diu heterogenea, mucus varii coloris, vermiculis quasi refertus & sperma ranarum referens excernantur. Interdum mucii tenacitas purgantia fere brassica exposcit.


TÆNIÆ CURAM vide sub morbis infantum. *Curationem sordium biliosarum* &c. vide sub digestionem laesa, cephalalgia biliosa &c.

EPILEPSIA EX CAUSIS PARTES EXTERNAS AFFICIENTIBUS, cujus paroxysmus instans sensu formationis vel auræ frigida ascendens suspicatur, ligaturis strictis praecavetur, & fomentatione, frictione, inunctione, scarificatione profunda, suppuratione diurna, inuisione, amputatione denique partis primo affectæ, vel ubi mali origo sedem habet, curatur; internis non neglectis, cort. peruv. camphora, opio &c. Præ-

Præcavetur sæpe paroxysmus epilepsiæ in genere sumendo gtt̄s xxx. sequentis. ℞. Afa foetid. pulveris. ℥j solve in spiritu cornu cervi succinato ℥j & superbibendo haustum infusi meraci specier. nervin. itemque infusum moschatum ano injiciendo; in specie vero verminoso-stomachicæ, vomitorio cum potu tepidæ largo & clystere ex sapone & sale, instante paroxysmo exhibitis. Et vomitus, fauces, si fieri potest, ope plumæ in oleum tinctæ, irritando, sub ipso paroxysmo excitatus, magna levamen adfert. Eo durante corpori pulvinaria supponenda, & dentibus linteum convolutum interponendum; Paroxysmo vero finito cardiaca propinanda.

Plures epilepticos, ex causa vix detegenda, haud verminosos, usus largus & diuturnus pilularum, ex mercurio mucilaginoso Plenckii, extr. valerian. spirituoso, asa foetid. & camphor. conflatarum, a malo quoque inveterato, liberavit. Eadem in affectibus epilepticis convulsivis hysteriarum concurrente obstructione mensium & in luis vener. reliquiis efficaces fuerunt. Inquiras nonnunquam in epilepsiâ simulatam. *Convulsiones, tetanus, tremor, trismus, chorea Sti. Viti, &c.* ex causis epilepsiæ proritati ejusdem medelam exigunt: jungendus cort. peruv. pertinax usus. Interdum emollientia in & externa locum habent. Emulsio ex ol. amygd. d. syr. de Alth. aa ℥j bals. peruv. gtt̄s. xxx. vitello ovi & aquæ melifs. ℥viiij composita & balnea emollientia; nonnunquam vero aqua frigida, copiose hausta. Profuerunt quoque flores zinc. indici, rite ppti, ter de die, ipecac. vel tarta-









tartarus emet. in minimis dosibus exhibiti. Morbis convulsivis ex causa externa paregorica remedia & chirurgia opem ferunt.

## VISUS VITIA.

*Causarum* plures & hisce appropriata medela, sub morbis capitis, in specie sub cephalalgia designatæ, oculorum morbis applicandæ sunt. *Ophthalmiæ humidæ, serosæ catarrhali* medentur, acrimoniam diluentia, demulcentia, & pro varia indole, varie corrigentia, feri affluxum ab oculis derivantia, revellentia & per idoneas vias eliminantia, externa demulcentia, sedantia, mundificantia, vascula relaxata, roborantia. In quem finem laudanda sunt: cathartica antiphlogistica, rhabarbarina, cum cremore tartari; Infusum folior. fennæ, cum decocto succoladæ pptum. diutius usurpatum; serum lactis acetosa pptum; Ptisanæ ex avena rad. gramin. bardan. tarax. lapat. & Liquirit. cum vel sine nitro compositæ; succi herbarum, betulæ; decocta lignorum; æthiops; morsuli antimoniales; pilulæ ex mercurio vivo mucilaginoso Plenckii & pulvere purificante conflatæ, tandem corticis peruv. præparata; Mars solubilis; acidulæ minerales martiales, cum vel sine lacte; Masticatoria; cortex cognidii ad brachia, vesicatoria minora, mitiora pone aures, majora ad partes inferiores; Cucurbitulæ scarificatæ, Nro. 6. & plures, suris omni hebdomade, denique bis in mense appositæ; Venæ sectio; infitio scabiei; inunctiones articulorum, cum uncto mercuriali ad scabiem. Horum selectum, temperies calida, plethorica, frigida, cachectica, cacochymia varia, lentor humorum, morbi progressus, complicatio, partium

relaxatio, glandularum intumescencia determi-  
nant. Inter topica profunt, initio pulpa pomor-  
rum, mucilago, lac &c. sub ophthalmia sicca  
descripta; album ovi, ad duritiem coctum, dis-  
sectum. R. Pulpæ castæ fistul. rec. extractæ  
ʒij Mucilag. sem. psylli, aqua papav. rh. extra-  
cti ʒj ms. & applica; sacculi pulvere valerian.  
fol. hyssopi & pauxillo camphoræ, flor. benzoes  
& gummi galban. repleti, libere desuper oculos  
pendentes; postea, albumen ovi cum aluminis  
gr. v-x. conquassatum; elutiones tepidæ cum  
aqua rosar. crocata; fots, lotiones, cum aqua  
fontana, admixta quarta parte succi portulacæ,  
initio tepidi, subfrigidi, denique frigidi. Hisce  
incassum tentatis. R. Aquæ rosar. ʒiv-vj. Vi-  
triol. albi ʒi ssi Saturni ʒβ Camphoræ in  
spiritu vini soluti gr. vj. ms.; (quod quoque ad  
*fistulam lacrymalem tam spuriam, quam veram*  
conducit) Ungtum oculare Sloane R. Tutæ pptæ  
ʒj Lap. hæmatit. ppti ʒij Aloes luc. ppt. gr.  
xii. Margarit. ppt. gr. xv. Pingued. viper. q. s.  
terantur curiose super porphyrite ac subigantur  
ut f. Ungtum molle - vel R. Ungti pomat. ʒβ  
Mercurii præcip. alb. gr. xii. ms. ejus pauxillum  
oculo affecto penicillo bis de die adfricetur, clau-  
sisque mox palpebris aliquamdiu retineatur; post-  
ea oculus aqua tepida cum aliquot guttulis spi-  
rit. vini mixta eluatur. Cautissime vero topicis  
repellentibus & acribus utendum, quæ, non nisi  
causis maximam partem sublatis, in morbo adul-  
tiore, habituali, urgente ob relaxationem sum-  
mam, affluxu & in minus sensibilibus locum  
habent.





PALPEBRÆ TUMIDÆ, foliis boni Henrici recent. impositis.

EPIPHORA SEBACEA, ophthalmiam humidam comitans, palpebras noctu agglutinans tutiæ pulvere, noctu asperfo curantur.

OPHTHALMIA GRAVIOR SICCA, a violentia externa, contusione, topicis repellentibus, in leviori ophthalmia imprudenter applicatis; ex particulis acribus, asperis oculo illapsis, inspersis; (in quæ facile prætervifa curate inquirendum) vel a principio interno, a plethora mota, hæmorrhagia inprimis narium suppressa, metastasi, catarrho gravi, in cacochymicis oriunda: remedia antiphlogistica, nitrosa, diluentia, demulcentia copiosa, evacuantia, revellentia, clysteres, pediluvia, venæ sectionem repetitam, cucurbitulas ad nucliam, interdum narium scarificationes exigat. Cfr. M. M. sub cephal. sanguinea. Temporibus & circa oculos apponantur hirudines N. 6. 7. & eductis ℥j sanguinis, vapores emollientes paregorici oculis admittendi. — R. Pomorum dulc. q. v. quibus prius aliquot frustula gummi Galbani vilioris immissa sint, assentur sub cineribus; pulpæ per setaceum trajectæ ℥iv admisce panis alb. ℥vj croci ʒj. alb. ovi in liquorem conquass. q. s. ut f. cataplasma s. hujus q. s. linteo exceptum oculo tepide admoveatur, firmetur, sine compressione, renovetur quarta quavis hora; sedato fervore, admisce aquæ vegeto-mineralis q. s. & camphoræ cum sîro trita aliquot grana. Cataplasma emolliens, paregoricum; non minus fronti & temporibus linteæ est. Galbani Bernh. madida applda. Simul-


C


fan-

sanguis columbæ vel pulli vel lac croco tinctum, oculis calide affundatur; aut pulcicula ex siefalbo & aqua rosar. confecta, & urgente dolore tandem ex sief. cum opio, mediante vesica, acu perforata, oculis injiciatur. Doloris & inflammationis vehementia sedata, fomenta ex stipitibus virid. dulcamar. & foliis hyssopi cum vino rubr. pptâ; tandem albumen ovi cum alumine mixtum & aqua ophthalmica supra descripta in usum vocanda. Eadem fere medela *ad ophthalmiam siccam, herpeticam, phlyctanoden* & *ex ulceribus corneæ enatam valet.* *Ulcera corneæ* & *sacci lacrymalis* mundificanda, solutione lapid. divin. gr. vj. in aqua calcis cochl. ij - iij & absterfione mediante infuso absynth. & hyperici cum aqua calcis ppto empl. diapompholyg; tandem applicando ℞. Aquæ calcis ℥iv. salis ammon. ℥j. flor. virid. aeris gr. I — II. solvantur. *Ad malum levius recens* & *ad inflammationem tarsorum* & *carunculæ lacrymal. cum oculorum siccitate*, sanguis columbæ, mucilago, lac crocat. (vide supra) vel lac maternum adhibenda vel ℞. carnis pomor. crud. mundor. ℥vj. album ovi N. I. in pulvem redactam massam, divide in duas partes, unam inter duo lintea, non nimium frigidam, applica oculo; hac calefacta, applica alteram, vel collyrium ex albumine ovi cum aqua rosarum conquassato, crocato pptum.

IN OPHTHALMIA EX FERRI PARTICULA *oculo infixo tentandum*, quid vis magnetica præstet.

OPHTHALMIA RHEUMATICA præmissis præmittendis, cort. peruv. cum tinct. Guajaci volat. ex decocto avenæ rad. gram. cichor. dulcamaræ copiosi-







pius hausto sanatur. Curatio *ophthalmiæ bilio-  
sæ periodicæ* sub cephalalgia: *Verminosa, vene-  
ræ, scrophulosæ, scorbuticæ*, suo loco petenda.  
Externe ad scrophulosam ungtum Sloane lauda-  
tur.


OPHTHALMIA a carie dentis & sæpius ab ab-  
cessu in sinubus maxillaribus latente orta, a  
multis prætervisa, dentis evulsione curatur.


CATARACTA *incipiens*, distinguenda a caligi-  
ne, & amaurosi, per opacitatem, pone pupillam  
conspiciam & a suffusione per visum nebulo-  
sum, decurtatum, curatur avertendo congestio-  
nes; (cfr. morbor. capitis curam) imprimis lym-  
pham acrem, spissam corrigendo, dissolvendo,  
revellendo, tonum restaurando. R. Saponis an-  
timon. extr. arnicæ spirituosi calomel. aa. ℥j.  
camphoræ, croci, aa. ℞j theriac. androm. ℥j.  
ms. f. pilul. gr. ii. pond. D. bis de die N. 4-8.  
extract. aconiti vel extr. hyosc. alb. a grani tri-  
ente incipiendo & sensim augendo dosin; extr.  
pulsatill. nigr. cum tribus vel sex partibus sŕi  
bene mixtum ad gr. v - xx - xxx. bis, terve de  
die; millepedes vivi contusi conserva rosar. ex-  
cepti Nro. vt - x. denique xx - l. ex sero lactis,  
rad. Valerian. fœnicul. sol. herniariæ, Euphras.  
& flor. arnic. alterato, quotidie sumendi. Ex-  
terne commendanda saliva jejuna, sedulo affri-  
cta; oleum animale, instillatum; spiritus salis  
ammoniaci vel eau de Luce, cavæ manus infri-  
cati & mediante hac oculis & naribus admoti.  
Errhina, ex nucleis hyppocastani, in clybano  
exsiccati, pulverisati & cum cubebis & sŕo mix-  
tis; scintillæ electricæ ex circumferentia oculo-  
rum elicita, ibidemque & pone aures hirudinés

appositi, oculorum & narium scarificatio, pediluvia tepida, crebriora. *Evitentur in hoc, uti aliis oculorum vitiis, aer frigidus, solis ardor, lucis splendor, acria in- & externa, fumus &c. lacrymæ, lucubrationes, microscopiorum & telescopiorum non coloratorum usus; visio assidua rerum minutarum, aliique oculorum labores.* Tandem ad auxilia chirurgica & dioptrica deveniendum.

**AMBLYOPIA ABSOLUTA, VEL VISUS DEBILITAS,** a retinæ sensibilitate minori, post oculorum defatigationes, præcipue in ætate profecta enascens, curatur, quiete oculorum perspicillis biconvexis; tonicis in- & externis, lotione quotidiana matutina oculorum, faciei & pone aures, aqua frigidiore, adjecta quandoque quarta parte succi portulacæ; infuso meraco, rad. fœnic. Valerian. herb. Euphrasæ. Cort. peruv. cum gttis x. essent. succini, juxta Hoffmann. pptæ, mane sumendo; ruta masticata & oculis adhalata, aqua ophthalmica confortante, crebro, frigide, cum fricatione adhibita, quæ ex grumis panis autopyri; (cujus pastæ pulvis rad. Valerian. herb. rutæ, flor. arnicæ, sem. fœnic. myrrh. & caryophyllor. aromaticor, subactus fuit,) per descensum, destillatur irrorando semper grumos, aqua rosarum, & cui aquæ vulnerariæ & camphoræ pauxillum admiscetur; nec non nodulis rad. Valerian. herb. hyssopi Euphrasæ, sem. fœnic. repletis, in vino rubro maceratis, noctu imponendis.

**HYDROPTHALMIA.** Cathartica, diuretica, vesicatoria, setacea, tandem paragentesin oculi & tonica externa exigit.





AMBLYOPIÆ, RELATIVÆ, MYOPIÆ, PRESBYOPIÆ ars dioptrica.

NYCTALOPIÆ, correctis causis occasionalibus & præmissis evacuantibus, revellentibus, venæ sectione, vomitorio, vesicatorio, cortex peruvianus opem fert.

AMAUROSIS vel suppressio visus sine sensibili oculorum opacitate, concurrente plerumque pupillæ immobilitate, cujus principium in cerebro, ad thalamos nervorum opticorum, in horum nervorum tractu, vel in tota retina. Causas vide sub morbis capitis *M. M.* sub cephalalgia, paralyfi, cataracta & amblyopia absoluta. Laudantur præparata flor. arnicæ. *Rx.* Flor. arnicæ  $\mathfrak{z}$ j -  $\mathfrak{z}$ ss. infunde aquæ  $\mathfrak{lb}$ . *i.* coque in vase tecto per  $\mathfrak{1}$ / $\mathfrak{2}$ . horæ & colaturam exhibe paulatim in die, vel pulv. arnicæ  $\mathfrak{z}$ j - *ij* in electuario; tartarus emeticus in parvis dosibus; & fonticuli in continuatione futuræ temporalis vel petrosæ inusti, aut scarificationes occipitis. *Rx.* Extr. aconit. gr.  $\mathfrak{ss}$ . sili albi  $\mathfrak{z}$ j mis. f. pulv. tenuiss. & f. tales *Nro. iv. D.* mane & vesperi unus.

AMAUROSIS INTERMITTENS cortice peruv.

CONGENITA INFANTUM aqua ophthalmica confortante.

AMAUROSIS EX VULNERE SUPERCILII ipsius pressione & frictione ea parte, ubi ramus nervi ophthalmici ex orbita emittitur, curanda.

STRABISMI species emendabiles curantur indagando Causas amblyopiæ & guttæ serenæ, iisdemque medendo; quandoque curam caliginis adhibendo. Ex prava consuetudine enatus, cu-

ratur perspicillis concavis, conoideis, apice tantum pertusis (Masques à lonchete) vel apud adultos, attentione & minorum ante speculum lectione.


**SUFFUSIO**, **SCOTOMA** vel hallucinatio visus circa phantasmata; nempe, puncta lucida, deorsum lentissime labentia; muscas, telas araneas, colores, scintillas &c., quæ suffusi vel oculis niditissimis gaudentes, præ oculis obversari sibi putant, a cataracta incipiente distinguenda, per pellucitatem humorum: plerumque ex sensibilitate nimia nervorum; in specie retinae, & quandoque ex diathesi phlogistica; plethora & congestionibus sanguinis & feri versus caput enascitur & curatur; mox roborantibus, antihypochondriacis, antihystericis, & mox antiphlogisticis; derivantibus & evacuantibus remediis; externis humorum affluxum diminuentibus, (vide amblyopiam) porro evitando attentionem melancholicam, causas occasionales; (vide cataractam) utendo denique vitris planis, colore subviridi, aut flavescente tinctis.

**SUFFUSIO** radians, seu epiphoræ, ophthalmiæ humidæ & amblyopiæ symptoma, sanato principe morbo, curatur.

**DIPLOPIA** plerumque intra paucos dies evanescens raro remediis indiget.

**CALIGO**, a **NEPHELIO**, vel macula corneæ subpellucida (ab opacitate humoris aquei, inspectione obliqua distinguenda).

**AB ALBUGINE** vel macula magis crassa, alba, subeminente; a *pterygio*, ungue nempe & panno & a *leucomate cicatrice*, causatur ab inflammatione



x ut R<sub>2</sub> V. Chamomil. f. v. ʒiij

Benedict Luleid. ʒj

Esf. Aloes. Ligo. Myrrh ad ʒj

m. D. befehlung. meist in derg. zugez. feld



tione variolosa, lippitudine, prægressis; ab ambustione; a rodentibus, spiritibus acidis, calce viva, collyriis aeribus & spiritu vini male applicatis, &c. curatur, sedata prius inflammatione, externis, vapore decocti Valerian. fœniculi hyssopi &c. succo anagallid. calcitrapæ; tandem chelidonii majoris; vel vino emetico, aqua rosar. diluto, bis de die caute instillatis; felle piscium, axungia viperæ; oleo chartæ, melle edulcoratis & apptis. instar vero omnium, pulvere ophthalmico cl. Baldingeri. R. Sfri albi, boli armen. albi vel rubr. cremoris tartari aa. q. s. ms. f. pulvis subtilissimus, cujus parva portio, absque irritatione & flatu bis de die oculo applicetur. Ad malum rebelle & interna, extr. aconiti & solutio mercurii sublimati &c. adhibenda. In malo ex causa venerea oriundo eadem solutio, pulvere, ex sstro & mercurio dulci constato, simul externe applicato, in usum vocanda.

LUPIA, HORDEOLUM ALIÆQUE EXCRESCENTIÆ fetus resolventes; frictiones cum limacibus & saliva jejuna; digestiva; empl. diachyl. cum empl. de ranis cum mercurio, mixtum; levia cathæretica, caute vero appda; spiritus salis ammoniaci guttulam, vel lapidem infernalem & tandem excisionem exposcunt. Excrescentiæ petiolatæ, filo vincienda & ulceribus inde enatis empl. diapomphol. appdum.

## AUDITUS VITIA.


OTALGIÆ CATARRHALIS EX DECUBITU PITUITOSO - SEROSO; RHEUMATICÆ, curationem vide


sub ophthalmia humida, rheumatica & sub cephalalgia.


Inter externa præprimis veniunt epithemata, vapores, prægorico discutientia; panis calidus dissectus, suffitus ex succino & stro auribus appta. succus rutæ, decocto alth. dilutus, oleum animale, auribus instillata.

**OTALGIA INFLAMMATORIA M. M.** vide sub ophthalmia graviore. Externe, cataplasmatibus, discutientibus, paregoricis interponendi sunt vapores ex lacte, flor. chamom. samb. & croco alterato, auribus admittendi; & lac cum rad. alth. flor. papav. rh. coctum ipsis instillandum, & hirudines circa aures ponendi. Si vero suppuratio evitari non potest, ad maturantia progrediendum, abscessus ruptio & puris exitus promovendi, respirationis nixu, sternutatione, vomitu &c. Ulcus mundandum decocto vulnerario, cum melle rosar. liquamine myrrhæ, balsam. sulphuris; simul meatus auditorius gossypio, muscarum aditum & vermium generationem præpediente, obturandus. Reliquarum specierum *A colluvie biliosa, a dente carioso periodica* &c. &c. curam vide sub ophthalmia.

**OTALGIA a CORPORIBUS QUIBUSDAM IN MEATUM AUDIT. INGRESSIS.** Corpuscula, lubricatis prius viis, suspensa manu, mediante vossella, educenda & insecta ope olei amygd. amar. injecti & diu retenti enecata, ope specilli, lana involuti & terebinth. imbuti, auri immissi, ibique circumacti, extrahenda vel nixu respirationis & sternutamento eliminanda.







## Surditas

- 1/ Succo allii salivi lanam bombycinam imbibere, illamque auri induere repetitis vicibus p̄ diem unicum in surditate rheumatica saepius seramen attulit. Meatus quidem auditorius inde subest dolet et sensibilis fit per diem unum et alterum, tum prorsus dandus que desquamantur redeunte saepe auditu.
- 2/ of. chamomill. rom & of. olivar mixt. tam auri immisto guttatum, quam ad tempora, verticem dorsalem regionem eo illinendum - Weikand v. of Lavand.
- 3/ Surditatis affectus dolorificus ē pruriginis iam mitigavit auribus immisum cochlear parvum aliquoties de die per minutas 4-5 alternation ab uno auro in alterius Extract. Tyridiquid. Goulard. of. Rosenstein
- 4/ in depravato auditu a Plethora et debilitate orto Radix theledorii major. rec p̄ otiduum auri immisto et imis jam profuit. Re

**AUDITUS DIFFICILIS, CONFUSUS; BOMBUS; SU-  
SURRUS; TINNITUS; SURDITAS.** Ponderatis cau-  
sis sub morbis capitis recensitis, & bene perpen-  
sis procatarctis curatio, sub cephalalg. san-  
guinea, pituitosa, serosa, stomachica, biliosa, ve-  
nerea, scorbutica, hæmorrhoidali, hysterica, hy-  
pochondriaca, idiopathica, periodica &c. descri-  
pta, accommodanda. Cfr. quæ sub cataracta,  
amblyopia, amaurosi & suffusione notata sunt  
remedia.

**A CERUMINE INDURATO, MEATUM OBSTRUEN-  
TE.** Injectionibus lactis, in quo sapo venet. &  
syrup. althææ solvantur & repurgatione meatus,  
mediante specillo curatur.

**AB OBSTRUCTIONE, COMPRESSIONE, PARALY-  
SI TUBÆ EUSTACH. cognoscenda,** si expirationis  
nixu edito, neque bombus sentiatur, neque tym-  
panum protuberet; & a *repletione cavitatis  
tympani quocumque liquido, rore condensato &c.*  
*plerumque ob tubam obstructam,* sanantur vapo-  
ribus ori admissis; gargarismatibus, e. gr. ex o-  
xymelle scillitico; masticatoriis, aërem masti-  
catione rad. angel. sem. fœniculi &c. medica-  
tum, vel fumum tabaci suctum, compressis la-  
biis & naribus, per tubæ viam impellendo; Er-  
rhinis, pilulis, extractis &c. ad cataractam or-  
dinatis; acidulis martialibus &c. Reliqua in- &  
externa vide sub cephalalg. pituitosa & paraly-  
si. Eandem fere medelam *vitia auditus, a  
laxitate membranarum* exigunt, quæ decubitu  
seroso, catarrhis, emollientibus male apptis &c.  
&c. causantur & ex prægressis, inspectione, au-  
ditu acutiori, si tympanum forte a causa qua-  
dam tendatur, ut sit in sono graviore & cœlo

sereno, & contra auditu debiliori, sub cœlo nebuloso, pluvioso, dignoscuntur. Profunt quoque panis recens dissectus, cujus pastæ rad. Valerian. baccæ lauri, sem. fœnicul. subacta fuerunt, & cui essent. castor. & spiritus vin. camphor. crocatus instillatur, auribus calide admotus; decoct. vinosum rad. Valer. fol. hysop. agrimon. centaur. min. ejusque vapor tepide immiissa; aqua ex frutice fraxini incensa destillans, cum succo sedi majoris & ovulor. formicar. mixta; castoreum cum sale volatili cornu cervi mixtum syndone involutum; oleum animale, chamom. acustic. Wedel. moschus, ope gossypii adpta; fumus nicotian. suctus & auribus inflatus, & olei petræ carbonibus instillati, iisdem apptus; foniculus processui mastoideo incustus; sillicidia, ignis electricus.

AD VITIA AUDITUS EX MEMBRANIS SICCS, EX regimine & medicamentis calidis; mora in aère fervido &c. oriunda, remedia blanda oleosa; lac; vapores molles adhibenda.

A FRAGORE MAGNO, aer naribus & ore compressis, nixu expirationis, sæpe in tubam Eustach. urgendus.

SURDITAS a CARIE, OSSICULA AUDITUS &c. occupante; a tympano rupto; exostosi; mala conformatione & defectu partium auditui inservientium incurabilis est a membrana meatus obducta, a polypo, steotomate aurem occupante chirurgiam exigit. Malum palliant tubi acustici; radii sonori aperto ore excepti & bacilli lignei inter furdi & loquentis dentes maxillæ superioris interpositi.

DEN-



in puritate a debilitate partium  
gutta ha causticae anglica eximia  
jam profuere R<sup>z</sup> of Amygd: ʒiiii

u-Bis Lxi ʒβ - ad ʒi m. aliquoties  
re die auri immittenda guttalem

- 1) odontalgia a dente carioso sustulit ei  
immissa Rad. hyoscyami in frustulis discisa
- 2) vel R. & Xci pur 3<sup>ss</sup> solo. in Juca Citr 3ii  
Madr. gossypio exceptum et denti carioso  
cavo dolenti impositum dolores sedat Biber
- 3) dentium dolores pertinaces sustulit Tinct.  
Colycanthidis Dalberg.
- 4) Adontalg. uti et aphthas sustulit plenarie  
R. solut. saturat. Resina quajaci in  
de utu yepafos l. u. Vini rectificat  
de qua essentia Cochlear 1 parvum suffic  
comixt. cochl. aliq. max. O lepid. omni mane  
Lond. convulsiv. a dente carioso. Ad hoc  
est remedium promptissimum

¶ in odontalgia sanguinea arthritica et  
reumatica

## DENTIUM VITIA.

ODONTALGIA. M. M. Sanguineæ vel inflammatorix, pituitosæ, ferosæ, stomaichicæ, hinc sæpe periodica, arthriticæ, venereæ, hystericae &c. &c. vide sub cephalalgia.

AD INFLAMMATORIAM simul cataplasmata, & collutio emoll. paregorica adhibenda; aliena calida; acria in- & externa.

ODONTALGIA GRAVIDARUM venæ sectione; *nutricum* vero, quandoque, non nisi dente sanissimo fracto aut evulso mitigatur.

AD PITUITOSO - SEROSAM VEL CATARRHALEM ET EX DENTIBUS CARIOSIS sæpius occurrentem, præter revellentia in- & externa; sudorifera, vesicatoria, hirudines pone aures, interdum venæ sectionem &c. (vide supra) laudanda sunt; infusum vinosum, anserinæ meracum cum essent. Guajaci vel pimpinell. liquore anod. min. & laudano liq. Sydenh. mixtum, in ore detentum; elixir. acid. Dipp. balsam. odontalg. cum & sine opio; oleum animale, camphoræ, caryophyllor. cajeput. vel horum loco napha vitrioli, cum pauillo laud. liq. Sydenh. gossypio excepta & cavitati dentis appta; fumus siri, tabaci, dentibus admissus; sal. vol. siccum angl. naribus adnotum; liquor anod. min. illis adtractus; spiritus bezoard. Buff. aliquot guttulæ, mediante bombyce auribus immixtæ, massæ odontalgicæ sequentis, cl. Voglero probatæ, portio fabæ magnitudine gingivis admota R. pulv. mastich. sandaracæ aa. ʒij sang. drac. optimi ꝑ ß opii crudii gr. II. ol. anthos destill. gtts viij. spirit. cochl. q. s. ms. f. massa emplastri consistentia. Sævities vero dolo-

doloris tandem, præmissa sufficienti evacuatione, opii interno usu mitiganda.

Quandoque dentis cavitas plumbanda, vel cauterium actuale adhibendum, vel ad evulsionem deveniendum. Qua operatione nonnunquam ophthalmia, cephalalgia, tussis &c. quas dentes carioli causarunt, curantur. Præcavetur dentium caries, os crebro eluendo decocto rad. lapath. acuti, folior. heder. arbor. salviæ, rutæ, flor. lavend. cui aliquot guttulæ cau de Luce vel spiritus salis ammoniaci instillantur, & fricando dentes, carbone panis vel fraxini pulverisato & panno aspero: Item masticatione myrrhæ. *Gingivis laxis, cruentis, ulceribus obsessis, dentibus inde vacillantibus & fœtori oris consulitur tinctura gingivali balsamica: Electuario sequenti, R. Tincturæ myrrh. ad dimidias abstractæ ℥ij pulv. fol. salviæ, flor. ros. rubr. ossis sepiæ aa. ℥iij sang. dracon. cort. granat. aa. ℥ij gummi lacæ, alum. usti. aa. ℥j mellis rosar. q. s. addi possunt cocinell. ℥ij & olei cinnom. aliquot guttulæ — vel R. Terræ catechu, sang. dracon. aa. spirit. cochl. q. s. ut leni digestionem solvi possint & f. linimentum spissius opernicilli appdum; masticatione crebriori gummi mastichis, vel trochiscorum terræ Japon. fol. acetosæ & cochleariæ; collutionibus elixirio vitrioli Mynsicht. cum melle ros. & s. q. aquæ mixto & scarificatione gingivarum. Cfr. curam scorbuti.*

STUPOR DENTIUM sublevatur linteo calido dentibus appto, masticatione portulacæ & acetosæ.

PECTO-

fumus. Sem hyosciam immit. adcurate patina  
stannea quavis patina tunc impletur  
aqua pura cocta adhuc fervente cui  
subito infundibulum ordinarius imponendam  
est patinam probe claudens, et deathi carosissimi  
commode apive suo immittendus Evaporatio  
hac aquae stuperficientis (in initio ego valde  
sensationem molestantem producentis) vermes  
ita necat, ut plerumque vermiculi subalbidi  
magitudine ovulorum mucos ordinario  
jam sunt deprehensa. Et calida supponatur,  
quo dein odontalgia mox cessat, pari modo  
uti otalgia a vermibus orta, caute semper  
Decoct. saturat. Hba cicuta. nec. v. Hyosciamia  
in lacte coct in os sumtum et instas  
collutorii exhibitum. Recidet.

pari modo conducit infusum saturat. fol  
salvice. et irid. nocte qua collutor, quo  
multum mucos et aqua extrahitur e  
loco affecto et dolores in dentibus-gingivis  
imminuantur eximie. Gmelin

In odontalgia frigida uti et in tumore  
frigido genarum masticatorium comendat  
R. Rad. Zingiber ʒij - mardich ʒss tercia  
igne fusa in bacillos et applica  
loco dolenti. id. Caryophil. pimpinell. Stol

Oris affectus.

9 In oris ulceribus inflammatoriis - stomacac

℞ Myrrh. Trofat ℥j solo. in mortar. <sup>aphtis</sup> c.

℞ Vitel. o. rot. ℥ij. a. mel. ℥ij. Vin. alb. ℥vj.

Misc. ad gargarum. et oris collat. mellen

9 in omnibus oris affect. except. aphtis den

putridis quam inflammat - in lingua et labiis

oris fissuris proficit quam optime. S. L. K. K.

℞ Borac: Ori depurat ad ℥j Magnes semp. ℥ij

℞ Sachar: alb ℥ij m. Dos. omni hor cochleas i par

## PECTORIS MORBI.


PHTHISIS PULMONALIS, pulmonum functionem læsam, & enata suppuratione, humorum corruptionem summam, per pus resorptum, eorumque jacturam involvens; suspicanda, ex tussi sicca vel humida, vel quæ comitatur aut reiectione quorundam, veluti granulorum, fœtentium, si conteruntur, corpuseulorum, cum sensu quodam in pectore gravante; aut si vomica aperta est, sputorum, maxime griseorum, flavorum, dum siccantur, subdulcium, vel salorum, fœtidiorum, in aqua subsidentium (nisi spuma sustineantur) valde fœtentium, si prunis injiciantur, viscosorum quidem, sed friabilium, hinc a mucosis distinguendorum, quæ in longa filamenta ducuntur, alba & pellucida magis sunt; porro suspicanda ex anxietate, dyspncea post pastum, per motum, scalarum ascensum, respirationem profundam & mitem fumum auctis; ex dolore pectoris fixo; decubitu in uno vel altero latere difficili; sapore falso, dulci, denique amaro; lingua rubra vel muco nigro oblecta; febricula, initio miti, post pastum percipienda, tandem hæctica, vespere exacerbata; pulsu frequenti, urina rubra, vigiliis, volarum calore; genarum rubore stipata; irascentia, emaciatione corporis, denique spasmo faucium vel raucedine, sudoribus nocturnis viscidis &c. &c. *ab hæmoptoe, in inflammationem & exulcerationem vel pulmonum debiliam infarctum abeunte; a diathesi phlogistica; a tuberculis crudis, pulmonum functionem impedi-entibus vel inflammatam & exulceratis; a peripneumonia exulcerata; a catarrho diuturno; a cacochymia varia, imprimis morbilloso,*

si, violentia externa & ab effluviis variis venenatis, acribus, acidis, metallicis; calcis viv. &c. pulvisculisque inspiratis enascitur. Id quod potissimum chemicis, metallifossoribus, statuariis, gypsariis, molitoribus familiare. Cfr. causas gener. quarum pleræque, ex hæreditate &c. &c. dispositis, morbum facile inducunt.

M. M. Varix causæ prædisponentes & occasionales varie corrigendæ, tollendæ, imprimis obstacula in abdomine latentia removenda, hæmoptysis præcavenda, curanda, methodo descripta; & pulmonum laxitati, & ex hæreditaria labe suspicandæ, decoct. peruv. rad. graminis & fol. millef. succurrendum.

INFLAMMATIO LENTA a causa gener. 10. - b, hæmoptysi male tractata; haustu frigido corpore calente, imprimis enata, sensu caloris; somno interrupto; macie, tussicula, febricula &c. per intervalla & sat diu affligens, venæ sectionibus parvis, diæta tenui, vegetabili; demulcentibus, decocto limacum, sero lactis, nitrosis, acidis, succo cucumerum, oxymelle &c. sæpe cum gummi ammoniaco, extr. cardui benedicti, cascar. & arnic. combinandis; cataplasmate ad pectus, ex farina herb. resolv. marrub. arnic. flor. samb. &c. cum aqua vegeto-miner. ppto; pediluviiis, sinapis sananda. *Colluvies biliosa*, si in culpa est, evacuanda. Eandem M. M. exposcunt *tabercula inflammata* catarrhalem tunc sæpe mentientia, febrem. *Taberculis crudis* sæpius ex hepatis vitio, & glandularum meseraicarum obstructione & abusu spiritus vini oriundis; tussi ovilla, quandoque pituitosa; respiratione ad motum, calorem







rem &c. difficili, stipatis, & exhaustos, interdum, sine ulcere & dolore, jugulantibus, medentur: Pilulæ viscerales N. adjectis extr. cicut. rubiæ tinct. liquirit. sapone antimon. sæpe scilla, nonnunquam calomel. emulsio gummi ammoniaci; vinum antim. Huxh. ad gttas xxx. perui instill. succi herb. heder. terrestr. tarax. &c. Conserva millepedum cum sulphure aurat. antim. liquid. mixta; Pulveres rad. ireos fl. seneg. rubiæ T. flor. benzoës hac conserva excepti: Decoct. gland. ilign. exsiccat. & parum tostorum rad. seneg. rub. tinct. & furfurum tritici leniter tostorum; infusâ rad. fœnic. enul. ireos flor. herb. heder. terrestr. marrub. alb. hyssop. flor. sambuc. arnicæ, admixto oxymelle scillit. eorum vapor inhalatus, derivantia, pediluvia, epispastica, cathartica ex rheo & manna, enamata; venæ sectiones parciore, topica ad pectus, nonnunquam ad hepatis regionem, si durities ibi detegitur, cfr. curationem glandularum meseraicarum & viscerum abdominis obstructionum; quæ sæpius phtisiam inducunt, mox vero mentiuntur.

**PHTHISIS** a steatmate, polypis, carcinomate, hydatibus; emphysemate, aneurismate, angustia aortæ, situ viscerum præternaturali, vix cognoscendis, rarissime medelam admittit.


**CATARRHUS INVETERATO** opem ferunt diætæ lacteæ; cathartica ex pulpa cassiæ, cum manna & rheo, repetita; subjunctis vesperi opiatîs, syrupo dracodio &c. demulcentia, emulsiones temperantes, diaphoreticæ, diureticiæ; pilulæ ex succo liquirit. myrrh. olibano, succino, mastiche & bals. peruv. sæpe de die, parvis dosibus, cum melle exhibitæ; suffimigia ex succino & mastiche  
&c.


&c. ferro calido inspersis & ibi liquefactis inspirata; subjunctis decocto peruv. cascarill. cum melle mixto; vesicatoriis ad furas & pro re nata venæ sectione.

**CACOCYMIA VARIA** vide Csas gener. Nro. 9. suis propriis remediis corrigenda, e. g. Phthisis scorbutica, succis betulæ, fumar. heder. terrestr. cum vel sine melle mixtis, serum acre tenue, retentum, retropressum, pulmones petens; emulsivis, demulcentibus, lacticinii cum balsamicis mixtis; decocto limacum; ostreis crudis, esu cucumerum, fragorum &c.; cicurandum, involvendum, discutiendum & revellendum, methodo sub cephalalgia serosa descripta. In hac specie fonticuli, setacea, sudor prudenter proleptus & purgantia lenia, cum opiatibus caute adhibita, sæpe locum habent.

**PHTHISIS INCIPiens, AB INSPIRATIS, PULMONES IRRITANTIBUS**, remedia lubricantia, demulcentia, sub tussi titillatoria ordinata; imprimis inspirationem vaporum emoll. exposcit. Quandoque ad pingua, glutinosa, axungias recentes; olea blanda &c. deveniendum. Iisdem remediis, calculorum, pulmones obsidentium rejectio facilitatur.

**PHTHISI ULCEROSÆ** medentur, acrimoniam purulentam cicurantia; per idoneas vias eliminantia, ulcera detergentia, consolidantia & jacturam humorum blande resarcientia; pulmones roborantia, aquæ Embsensis, Fachingenses, Selteranæ, cum lacte capræ, aut asinæ, aut vaccæ, herbis antiphthisicis nutritarum, decoctum hordei, avenæ, cum lacte, vel acidulatum; lactebatyratum; serum lactis, cum cerevisia pptum &






& herb. millefol. tussilag. heder. terrestr. arnic.  
 ruta mur. aut succis herbarum & præcipue dau-  
 ci bortenſis, vel ſtro ſuccis imbuto (quorum præ-  
 parationem vide ſub obſtructione viſcerum) al-  
 teratum. ℞. Infuſi per macerationem ſaturati  
 & cum expreſſione colati rad. card. fullon. rec.  
 ſaponariæ, ſummitatum, herb. urtic. minor. uren-  
 tis, heder. terreſtr. millefol. bellid. min. cum flor.  
 coque vaſe bene tecto, porro ad dimidias, lente  
 & cum mellis tantundem ad electuarii diluti con-  
 ſiſtentiam redigatur & aceto vel elixirio acido  
 aciduletur. ℞. D. omni 1/2. horæ cochlearculum —  
 ℞. Hrb. botryos Mj. ſpirit. vitriol. gtt̄s xx. ſſri.  
 q. s. ut f. l. a. conſerva ad ℥ij de die ſumenda,  
 conſerva roſar. mollis, aut ſolida; ſuccus cucu-  
 merum cum ſſro mixtus; lac medicatum: —  
 ℞. Balſ. de copaiv. ſſro ſubact. ℥j, adde emul-  
 gendo lactis rec. ℥ſſ. aquæ ſaching. vel ſelter.  
 ℥ij. D. omni hora ℥ij; aut ejus loco, extr. myr-  
 rhæ aquoſ. cum æq. portione ſſri lactis mixtum  
 ad ℥j. exhibitum, — ℞. Extr. caſcarill. aquoſ.  
 cichor. aa. ℥ij. interdum extr. cicutæ ℥j. extr.  
 croci ℥j. pulv. roſar. r. heder. arb. aa. ℥ſſ.  
 ſpirit. vitrioli dulc. gtt̄s. xx. balſ. peruv. q. s.  
 ms. f. pil. gr. iij. omni trihorio 3 - 4. ſumen-  
 dæ — ℞. Extr. cort. peruv. ℥ſſ. ſaponar. gly-  
 zirrh. aa. ℥ij. croci ℥ſſ. mucilag. ſem. cydon.  
 q. s. ut f. elect. doſis ℥j. bis, quater de die, quæ  
 vero diminuenda vel cortex plane interdicens,  
 ſi ſputa inde ſupprimantur. Prædicant nonnul-  
 li ſemen phellandrii ſive foeniculi aquat. & ℞.  
 Lichen. island. ℥j. digere cum aquæ font. ℥xvj  
 ad remanent. ℥xij. & adde ſyrup. ſcill. ℥ſſ. D.

omni bihorio ꝑj. — Recensitis vero longe præstat sequens, crebriori & quotidiana experientia probatum, ad acre tenaciter involvendum & partes gelatinoso-glutinofas refarciendas &c. efficacissimum remedium. (\*) R. Limaces tres, quinque, bene lotos, incisos & contufos, coque in decocti rad. graminis, taraxaci, herb. marrubii, millefol. virgæ aureæ &c. quibus femoris vitulini pars addi potest. Hiß, ad dissolutionem limacum; in colatura solve syrup. de farfar. vel sri rofac. ꝑß. & pro re nata adde lactis tertiam partem D. mane per vices, subjunge elixir. ex extract. card. bened. cascarill. aquoso, spiritu nitri dulci & aqua menth. compositum, ante epulas adhibendum; vapores ex decocto pectorali, cum oleo terebint. mixto inspirati; exulcerationes artificiales, vesicatoria, foniculi, intra costas inusti, setacea, imminente quidem suppuratione magis proficua; cataplasma supra notatum; empl. de Galbano; ungtum volatile ad pectus; aëris mutatio, equitatio; mora in aëre, exhalationibus ceræ flavæ & picis, igne liquefactarum impregnato; inspiratio aëris fixi, ex mixtura cretæ & aceti ascendentis; ambulatio inter abietes; diæta ex alimentis eupeptis, blandis, acescentibus, acrimoniam corrigentibus, demulcenti

(\*) *Maculae ex linteis colaturæ limacum inservientibus haud elui possunt. An succus expressus cochlearum parvularum, quæ super carduo stellato inveniuntur, a cel. Morgagni commendatus ejusdem virtutis est?*





*No. of asphaltum.*

centibus, crebro, sed parce ingestis: olera congrua daucus hort. cichor. urtica min. urens, brassica crispa &c. cum vel sine jusculo carnis & cancr. fluviat. pptā, adjecto succo aurantiorum; acetaria ex lactuca, bellid. min. cichor. &c. omiſſis tunc lacticiis; jusculum emulsivum Fulleri; gelatina ex avena excort. **tsß** ras. C. C. passul. aa.  $\mathfrak{z}$ ij. canctor. fluv. contus. Nro. XII. & femore vitul. concis. & cum ossibus contract. confecta, sago aquæ & lacti incoctum. Pulmentum ex farina secalina aqua & butyro infuso coctum, cum vel sine lacte caprino. Decoctum ex farina avenæ tostæ, paxillo chocolat. & lacte pptum. Roob pomorum spissius; lacticia, ventriculo canon respuente; cerevisia medicata. Interponenda interdum cathartica manata, nisi diarrh. colligativa instans ea interdicit. Ex enarratis caute seligenda, quæ cuilibet temperiei, gradui, causæ prægressæ, probe discernendis & morbo complicato quadrant. Et hac sub conditione balsamica, præparata animalia & cortex peruv. & acida mineralia, a multis hic damnata, magni usus esse possunt, experientia teste.

**SYMPTOMATA MITIGANDA:** TUSSIS victu tenui; potu demulcente; frequenti, in ore gestatione trochiscorum ex pulpa rad. alth. gummi arab. stroptorum; butyro cacao; syrupo diacodii & denique opio, caute adhibito.

**AD SPUTA VERO SUPPRESSA** solutio gummi ammoniaci in aqua hyssopi, adjecto oxym. scill. & syr. diacod. fomenta emoll. tepida ad pectus; vapor ex infuso herb. aromaticarum, cum aceto mixto, inspiratus.

AD VENTRICULUM DEBILIOREM infus. frigid.  
herb. card. bened. strom myrrh. elixir. ex ex-  
tract. cascarill. aquos. &c.


FEBRIS venæ sectionibus parvis, pro virium  
condicione repetitis, acidis, syrupo acetosellæ,  
oxymelle, succo cucumerum maj. fructibus ho-  
ræis maturis; electuario supra descripto, cum  
tantillo nitri; non minus, si sordes primarum  
viarum peccant, catharticis antiphlogisticis cicu-  
randa. Exulent vero, quæ sanguinis calorem  
& acrimoniam putridam, vel biliosam intendunt:  
Balsama, lac, juscula carnis & similia, nec non  
cort. peruv. si nempe sanguis ex phlogosi spif-  
sus & vera inflammatio timeatur.


SUDORES COLLIQUATIVI leniendi emulsione  
diacodiata, saturatori, cum decocto hordei & a-  
quis analeptics parata; lacte ebutyrato; deco-  
cto quassia, aqua calcis cum lacte, nonnunquam  
haustulo vini Pontak, aëre frigidiusculo, lotionem  
roborante.

DIARRHOEA COLLIQUATIVA decocto quassia;  
enematibus ex decoct. cort. peruv. saturato, la-  
cte & pauxillo opii pptis.

PHTHISIS FEBRES, INPRIMIS INTERMITTEN-  
TES excipiens, evacuatis fordibus, sublatis obstru-  
ctionibus viscerum & correctis impuritatibus  
sang. cort. peruv. expolcit.

CURATIO PHTHISEOS NOTHÆ, pulmonibus  
illæsis, sputo varii coloris, viridis &c. purifor-  
mi stipatæ; arthriticis, hæmorrhoidariis, gravidis  
præcipue familiaris; *puogenescos* & *febris lenta*  
& *hæctica*, a viscerum abdominis vitiis, exulce-  
ratione evenientis parum a præcedenti differt.






*In hepatis quidem exulceratione*, quæ dolore hypochondrii dextri compressivo, pulsatili; respiratione anhelosa; cutis colore flavescente; urina crassa, rubra; dejectionibus, mox durioribus, mox liquidis & spumosis stipata est, puris excretio per laxantia, resolventia, rhabarbarina, salina, mitiora, inprimis per clysteres ejusmodi; *Et in venum exulceratione*, quæ gravitate continua in lumborum alterutro; cruris scapore; urina sedimentum fluidum, album, mucidum, lacteum, cruentum deponente incedit, per lenia diuretica, sal ammoniacum &c. promovenda est. *Uteri exulcerationi*, quæ ex dolore, in infimo ventre & effluxu humoris purulenti cognoscitur, potissimum injectionibus & fotibus idoneis succurrendum est. Semper vero non satis laudandum illud decoct. limacum, subjunctis clysteribus visceralibus, crebrioribus & elixirio supra notato, cui extr. cicutæ admisceatur, in usum vocandum est.


## T U S S I S.

**CATARRHALIS, TITILLATORIA:** BRONCHUS potissimum ex transpiratione, frigore suppressa oriunda, curatur sero lactis, ope cerevisiæ ppto, vel decocto sarsurum leniter tostorum cum rad. ircos florent. herba tussilaginis, veron. florib. samb. & verbasci infusis & melle edulcoratis; vaporibus ejusmodi inspiratis; decocto dauci hortens. Rapar. emulsivis mannatis; sstro glyzirrhizato & pasta dialth. crebrius in ore gestatis; mucilage cydon. butyro cacao; looch. ex ovo, mucilaginoso; melle cum pauxillo pulveris zinziberis mixto; pulvere ex spec. diaireos rec. ℞ flor.

sulph. nitri dep. aa. ℥ij. croci ℥j. stri canar.  
 ad pond. omnium conflato, adjectis pro re nata,  
 salis ammoniaci puriss. & feminis anisi aa. ℥℞.  
 & opii aliquot granis; pomo excavato, melle im-  
 plecto & cocto; eclegmate ℞. Ol. amygd. d. ℥℞.  
 spirit. vitriol. parum dulcificati ℥j. syrup. papav.  
 rh. ℥iij. ms. agitando dentur per vices cochle-  
 arcula aliquot. — ℞. Rad. alth. ℥ij. graminis  
 ℥j. fol. tussilag. Mij. concis. coque in s. q. aqua,  
 sub finem coctionis adde flor. verbasci M. j.  
 rad. fœnic. enulæ aa. ℥℞ liquirit. ℥ij. croci  
 ℥j. & post sufficientem digestionem colaturæ ℥iv.  
 admisce antimonii diaphor. non abluti ℥i℞. sy-  
 rup. diacod. ℥i℞. oxymell. scill. ℥iij℞. D. omni  
 bihorio ℥iij. externis revellentibus, pediluviiis  
 &c. Nonnunquam febris & tussis vehementia v. f.  
 exposcit. Materia peccante sufficienter cicurata  
 & per diaphoretica, cathartica, imo vomitoria,  
 quæ potissimum, concurrente colluvie biliosa  
 non negligenda sunt eliminata, roborantia cor-  
 tex peruv. cascarill. &c. adhibenda sunt. Ea-  
 dem fere medela lubricans, demulcens cum va-  
 poribus valet in tussi ab ariditate tracheæ &  
 pulvisculis acris inspiratis, nec non a corpu-  
 sculis peregrinis in faucibus, partim muco in-  
 tricatis, hærentibus, subjunctis, hoc in casu vo-  
 mitorius & a muco fauces titillante; ubi vero in  
 hæmorrhoidalem morbum simul inquirendum  
 est. (cfr. morbos œsophagi) Ad raucedinem  
 cum tussi nuptam, decoctum brassicæ rubræ, sro  
 edulcorat. & pauxillo nitri alteratum.







TUSSIS CATARRH. DIUTURNÆ VEL HUMIDÆ, MUCOSÆ, HABITUALIS phthifin sæpe mentientis curam vide supra sub phthifi, ex catarrho inveterato. Conferunt quoque matricatio camphor. & olibani; emulsio gummi ammoniaci cum syrupo altheæ; balsam. de copaiva, ex ovo forbili, eff. Galb. Bernh. elix. peft. Wed. sulphur aur. antimonii potabil. spirit. salis ammoniaci anif. extracta, vel succi inspissati card. bened. tarax. heder. terrestr. cum oxymelle scill. ex decocto rad. rub. tinct. pulvis cascarillæ, purificans; externe pediluvia; clysmata; vesicatoria ad furas; remedia ad tubercula cruda. Horum selectum feri acrimonia, mucii tenacitas, pulmonum relaxatio & stomachi vitia complicata, determinant.

TUSSIS CACOCHYMICÆ RHEUMATICÆ medellam vide supra sub phthifi, a cacochymia varia.

TUSSIS PLETHORICÆ, SICCÆ junioribus, plethoricis, post s. evacuationes retentas, suppressas vel ex tuberculis, calculis, polyphis pulmones obsidentibus, &c. evenientis, curam vide sub hæmoptysi & phthifi.

TUSSIS STOMACHALIS, ex stimuli sensu, in scrobiculo cordis, quoties tussendi paroxysmus instat; ex tussis, post epulas, cum conatu vomendi, vel vomitu evenientis, vehementia & fonitu profundo & criteriis, sub cephalalgia stomachica notatis cognoscendæ, curationem absolvent vomitoria; purgantia & præparata ex rad. enulæ, foeniculi, quassia, ir. flor. zingiberis, cort. cascarill. herb. marrub. alb. card. bened. hyfop. R. Mann. el. ℥j. sal. ammon. ℥ij. extr. enyl.

card. bened. aa. ʒj. conserv. flor. salv. ʒʒ. syr.  
de hysoy. q. s. ut f. elect. D. omni triborio ad  
nucis jugland. magnitudinem. Vide reliqua sub  
digestione læsa.


TUSSIS HYPOCHONDRIACA, HYSTERICA, ex mo-  
bilitate nempe nervorum, ex obstructione visce-  
rum abdominis & *tussis ex irritatione nervo-  
rum, per vermes, dentitionem difficilem, costam  
fractam* &c. proritata, medendo principi mor-  
bo & illa a variis insectis intra pulmonem de-  
litescens, succo marrubii albi & scilla cu-  
ratur.


TUSSIS CONVULSIVA IN GENERE, modo an-  
tihysterica, opiata, extract. capitum papaveris  
rhoados a gr. ij. ad x — xx. modo involventia,  
demulcentia, spermaceti recens, jusculo calidif-  
simo solutum, adjectis aliquot grans flor. benz.  
eclegma sub tussi catarrh. descriptam; modo et-  
iam expellentia, vinum antimon. huxh. flor. sul-  
phuris larga dosi & revellentia exposcit. (vide  
supra sub phthisi a cacochymia & sub catarrho  
suffocativo) Et quavis tussis ferina; graves mor-  
bos, apoplexiam, hæmoptysin, abortum, herni-  
am &c. minitans, præcipue illa ex anomalia mo-  
tuum, post animi affectus convulsiva, opio mi-  
tiganda, præmissa in plethoricis v. f.


TUSSIS CONVULSIVÆ STOMACHALIS CLANGO-  
SÆ VEL FERINÆ medelam vide sub morbis in-  
fantum.

## A S T H M A.

Ut tussis, optime in humidum, ex materia  
catarrhali, pituitosa, viscida, & siccam ex f.  
eva-












evacuationibus retentis, suppressis & ex irritantibus inspiratis; porro in *cacochymicum*, a sero acri retento, retroacto; pedum œdemate, sudore repulso &c. in *stomachale*, *hypochondriacum*, *hystericum*, ex flatulentia, mobilitate nervorum, obstructione, tumore viscerum, ascite sæpe latente & in *convulsivum varium* distinguitur & eadem fere methodo sanatur. Perpensis ergo sedulo morbis prægressis & concomitantibus & causis paroxysmum accelerantibus & retardantibus, remedia selecta, ex illis, quæ sub variis tussis & phthisicos speciebus descripta sunt, huic morbo applicanda sunt. Sæpius obvenit *asthma ex pituita lenta, cum stomachi, hypochondriorum vitiis & flatulentia complicatum, concurrentibus semper spasmiss, interdum acrintonia*. Hinc rories in usum veniunt emetica, rad. ipecac. cum liq. anod. m. frigide infusa & parvis denique dosibus, crebro exhibita; cathartica; elysinata mox acria, mox antispasmodica, carminativa, cum asa foetid. ppta; vapores ex infuso salviæ, flor. sambuc. cum aceto vel sale ammoniaco mixto inspirati. Rad. seneg. rub. tinct. herb. & flor. arnic. scill. dracunculus; crocus; gummi ammoniacum; sagapenum; ess. Galban. Bernh. sulphur aur. antimonii potabile, oxymell. colchicum, spiritus salis ammoniaci anis. elix. pector. Wed. kermes min. vinum antimon. lухh. ℞. Herb. rec. mari veri ℥℞. kermes min. gr. ij. sachari q. s. ut f. conserva D. pro dosi bis de die — ℞. Pulv. summitat. marrub. alb. ℥j. croci ℥℞. moschi gr. ij. extr. card. bened. ℥ij. extr. capitum papav. rh. gr. iij. mucilag. sem. cydon. q. s. ut f. bolus ex intersq. fabricato fol. hysopi heder. terrestr. & flor. achi-

cæ, sambuc. oxymelle scill. largitey alterato  
 vel ex vino generoso calido, quassia prius infuso,  
 bis de die sumendus — Mixtura asthmatica Tril-  
 lero probata: ℞. Aquæ dest. tussilag. pulmon.  
 veron. fœnic. hyfop. aa. ℥j. elix. pector. Wedel.  
 ℥ij essent. pimpin. alb. liquirit. aa. ℥j. extr. casca-  
 rill. enul. ℥j. syr. de alth. ℥j. oxymell. scil-  
 lit. ℥℞ D. omni trihorio cochl. ij. — ℞. Aqua  
 hyfop. ℥x. spirit. sulph. p. c. ℥j. mixtis instilla  
 liq. cornu cervi q. s. ad saturationem, dein ad-  
 de gummi ammoniaci acet. scill. soluti vel ascæ  
 fœtid. ℥ij syrup. de hyfopo ℥j. D. omni 2. hor.  
 cochl. ij — ℞. Gummi ammoniaci aceto scill.  
 sol. ℥ij. oxymelle scill. ℥ij. aquæ majoran. hy-  
 fop. aa. ℥iij. ms. D. omni trihorio cochl. ij —  
 ℞. Millepd. vivor. ℥℞. contusis in mortario  
 affunde aquæ asthmat. hydromellis aa. ℥vj. cum  
 colatura fortiter expressa conteratur ac emulgea-  
 tur gummi ammoniaci ℥℞. stri albi ℥j. traje-  
 ctus liquor D. omni 6horio ad cochl. ij. ex cy-  
 atho infusi hyfop. & flor. arnicæ, cui portiuncula  
 spirit. salis ammoniaci anisati instillatur. — ℞.  
 Ess. Galb. Bernh. inspiss. ℥iij. gummi sagapen.  
 saponis antimonialis, mucilag. gummi arab. bulbi  
 ari. rec. aa. ℥j. bene invicem tritis admisce  
 extr. enulæ, hyfopi marrubii alb. spirituosor.  
 card. bened. aquosi aa. ℥ij caput papav. rh.  
 bals. tolut. aa. ℥j. ms. f. pil. gr. ij. pond. D.  
 4ier de die 10 - 15. ex infuso herb. heder. ter-  
 restr. marrubii alb. dracunculi, millefol. hy-  
 fop. rad. ir. flor. enul. sem. fœnic. vel ejusmo-  
 di, ms destillatis; junctis interdum, specificis  
 anti-

Rafesnska



antiepilepticis, nitro, v. s. revellentibus, pediluviiis, cataplasmatibus, sinapismis, vesicatoriis ad pedes, fomentis, ungtis ad pectus, immersione brachiorum in aquam sat calidam, cum frictione; remediis fluxus suppressos revocantibus &c. &c. Cfr. curam digest. læsæ, tuberculorum crud. & arthritidis anomalæ. *Asthmatis sicci species, ex tuberculis crudis & arthritide anomala enata equitatione, juncto lactis usu mitigatur. Curam asthmatis a cerebri vitiis & inde enata levi resolutione nervorum, pulmonum, diaphragmatis & reliquorum musculorum respirationi inservientium vide suo loco.*


ASTHMA VEL ORTHOPNŒA EX TUMORE COLLI magno, rebeli, essentia aconiti brevi curatum est. *A vermibus in ventriculum & œsophagum reptantibus, ab hydrothorace, medendo principi morbo; a venenis, fungis, vaporibus venenatis, remediis sub cephalalgia & vomitu notatis: a violentia externa vehementibus costarum aut sterni contusionibus, fracturis, luxationibus & cartilaginis xiphoidæ intropressione chirurgia & asthma periodicum præmissis præmittendis cort. peruv. sanatur.*

ASTHMA EX POLYPIS CORDIS, ejusdem magnitudine p. n. aneurismate aortæ; ex cartilaginum costarum, immo annulorum bronchiorum ossescentia; tuberculis copiosis, calculis prægrandibus; vomitis pulmonum; tumoribus variis; emphysemate pulmonum; gibbositate; laryngis vitiis, tumoribus, ulceribus &c. strumis colli inveteratis enatum, vix sanabile est.

## CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

ſtrictè ſic dictus, eſt inſarctus bronchiorum, ex deſluxione copioſa, repentina materiæ catarrhalis, per glandulas univerſæ arteriæ aſperæ relaxatas; concurrente interdum conſtrictione ſpasmodyca, ex acrimonia pituitæ & repletionem vaſorum encephali, ob ſang. circulum, in pulmonibus impeditum. Indicantur v. ſ. pro re nata repetita, enemata acria, tandem ex fumo tabaci; manu- & pediluvia calidiora, cum frictionibus & reliqua revellentia externa, veſicatoria &c. vapores ſupra notati inſpirandi; fomentum diſcutiens, emolliens vel linimentum volatile ad pectus; bolus, mixtura ad aſthma; ſulph. aurat. antimon. potabile, cum æquali portione ſyrupû croci mixtum & omni 1/2. horæ ad cochlearculum unum aut alterum propinatum; extr. aciniti (vide ſub cephalalgia ſeroſa) ipecac. vel tartarus emet. in parvis doſibus exhibiti; ſpirit. falis ammoniaci aceto ſaturat. adjecta MPil. decynogl.; oleum animale, cum naphtha vitrioli, paulillo ſcillæ inprægnata, mixtum, ex infuſo calido, copioſo folior. hyſopi &c. (vide ſub aſthmate.) Interdum antiphlogiſtica interponenda. *Ad catarrhi ſuffocativi ſpeciem* ex deſtillatione materiæ catarrhoſæ viſcidæ, acris, per nares internas, laryngem male afficiente; præter potum calidum, diluentem, demulcentem, diaphoreticum, copioſum, gargarismata & linimentum volatile ſupra notatum, collo appda.

CATARRHI SUFFOCAT. SPURII ex inflatione ſumma ventriculi; ex vaſorum encephali lenta obſtinatione; ex polypis &c. &c. curationem vide



Raucae: e tussi plures sicutulis forest.

1) R. Hb. Malv. mi. cap. in v. font. q. f. col. 3viii ad  
L Symp. Violar. 3/3 M. f. Apozema.

2) Rudyr. Cacao rec. pti vel gargarism  
ex Roob Sambuc & Com. dilutum  
v. masticatio simpl. Caric l. Dicaloria  
v. Paofularum maj. zibeba, zibeba, etc.

3) Raucae chronic. pertinacem p. 6 mensib.  
durant sicutulis Plenk ore gargarism  
e Cord. Chin. Anis flor. e adorta  
& Vulner. Theden.

4) R. Oxmel. Sicily. Symp: bals-Enuf. ad 3viii  
Re pector. Jan 3ii v. Oxci anis 3i-3ii  
v. Sacher. lact. crystallis 3vi g. arab 3ii  
flor. Anis 3i m. f. f. Donuli 2 hor  
2-3 cultu curpid:

/Z u



vide sub cephalalgia, asthma & tussi convulsiva.

## RAUCEDO.

Csas & M. M. vide sub tussis variis speciebus. Pertinacioris ex glandularum arytenoidearum obstructione oriundæ medelam vide sub tuberculis. Valent inprimis vapores ex infus. flor. sambuc. &c. inspirati. *Raucitas* & *aphonia periodica* malo hysterico, moliminibus hæmorrhoidalibus, vermibus, lascivie medendo, *siphilitica*, *scorbutica*, ex *ulceribus consolidatis* suis propriis medicinis curatur. *Raucitas* & *aphonia ex nervo recurrente, dissecto; ulceribus profundis, venereis* & *phthisi consummata* enata incurabilis est. *Aphonia* ex congestione s. versus cerebrum curam vide sub apoplexia.

## PALPITATIO CORDIS.


Csæ. Vitium cordis ejusque valvularum & corporum cor proxime ambientium, callositas, aneurisma &c. polypi calculi; an vermes? &c. in illis contenti; vitium viscerum remotorum, cerebri, intestinorum, a vermibus, flatibus affectorum. Cfr. Csas gen. 1, - a - c. 2, a - f. 3, - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - M. M. Pro causarum diversitate admodum diversa est; sæpe v. s. temperantia, evacuantia, opiata, antihysterica, anthelmintica, nutrientia, revellentia externa locum habent. Quod si vero malum idiopathicum, incurabile est, mitigantia conveniunt; huc refer  
*andu-*


*aneurisma cordis & vasorum vicinorum majorum* crebrius obveniens, ex gravi pertinacique molestia in præcordiis, cum sensu ponderis & magnæ molis pulsantis & præfocantis quasi, a minimo motu crescente suspicandum; ab hujus ruptura mors subitanea.

**POLYPI CORDIS & VASORUM MAJORUM** rarissimus quidem in viventibus morbus. Cæsæ gener. 1, - b - c - 2, 3, 4, 6, 8, 15, imprimis animi deliquia frequentia aliique morbi fontici prægressi; moeror; spiritus vini abusus. Inter signa fallacia quidem referuntur palpitatio cordis frequentissima; pulsus inæqualis, intermittens, debilis; dolor fixus in pectore, præcipue in sinistra parte, gravativus, anxius, titillationis sensus, circa cor in ex- & inspiratione contingens; dispnoea; eorum augmentum ab omni motu & stimulantibus; vasorum colli magnus motus. *M. M.* Cæsæ prædisponentes & occasionales corrigendæ, morbus palliandus v. s. repetitis; diluentibus, saponaceis, resolventibus — R. Pulpæ tamarind. roob. samb. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$  nitri depurati  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ms. s. bis de die, mane cum sero lactis, vesperi vero cum parægorico camphorato, per sesquimensem usurpandum.

## LIPOTHYMIA SYNCOPE.

Cæsæ. Nervi, sive ad originem compressi sive alibi irritati, dolore, odore, gravibus animi perturbationibus &c.; cerebri & cordis morbi; hujus fibrarum laxitas & cavitatum, imprimis auriculæ dextræ dilatatio naturali major; aër cor. nat. distendens; polyphi in eo contenti &c. hydrops






drops pericardii &c. vide Csas. gener. 1, - c-d-2, - f- 3, 4, 5, - b-c-d-e-f- 6, 9, 10, 15. digestio læta; flatus, idiosyncrasia. Instantem paroxysmum avertunt immersio brachiorum ad cubitum usque in aquam sat calidam, frictione sub aqua simul adhibita; aer frigidior, liberior; potus frigida; situs horizontalis; vestimentorum relaxatio; Elæostrum cinamom. spirit. castor. compositus; spiritus æthereus, cum balsamo vitæ mixtus; pilulæ ex asa foetid. castor. camphora mastiche, sale cornu cervi & terebint. conflata; ex infuso fol. salviæ, melissæ, rutæ, asperulæ &c. succo citri acidulato; nec non lenis vomitus, faucium titillatione, vel infus. chamom. card. bened. tepidum affatim bibendo &c. excitatus, si nempe ingesta discepta, venenata, saburra acris, putrida, maligna subesse putentur. Ex præsentī excitant aquæ frigida conspersio in faciem, nucham; inflatio errhinorum; foetida; salia volatilia, spirit. castorei compos. acetum rut. cum aqua anhaltina mixt. sal volat. angl. cepæ dissectæ; pulvis odoratus — R. Ol. still. cinamom. gtts. vj. meliss. rorismar. aa. gtts iv. sal. vol. sicc. ammoniaci ℥β. ssi alb. ℥β. cinabaris q. s. ad coccineum colorem accurate mista, vasculo vitreo immissa, obturaculo vitreo claudenda, naribus supponenda; titillatio faucium; frictiones lenes, concussiones & abdominis pressionēs; epithemata ex supra notatis, ad tempora, axillas, præcordia, carpos manuum; clysteres antihysterici, denique acres ex fumo tabaci; sinapismi; cucurbitulæ; inflatio aeris in os, ope tubuli; immersio brachiorum in aquam calidam.

Post paroxysmum analeptica, vitum generos. aromaticum; elixir nervinum; jascula consummata; gelatinæ aromate conditæ & remedia, quæ varius morbi fomes, cacochymia varia; exanthemata retropulsa; vermes; digestio laesa; flatus; dolores; inanitio; antipathia; animi pathemata; malum hystericum &c. exigit. In lipothymis, ex hæmorrhagiis, abortu enatis & plethoricarum, absint excitantia, acria, calida. Eadem sere ratione suffocatis, per vaporem carbonum, sodinarum metallicarum, latrinarum, sepulchrorum, puteorum, liquidi fermentantis &c. &c. succurritur; simul v. f. in aëre libero instituenda & lavationes frigida ex oxycrato, epithemata ad caput & pectus & enemata ex eodem adhibenda; *agua submersi* vero stragulis calidis, vel arena, cineribus calefactis obtegendi & *congelati* nix fricandi sunt. Sub syncope defuncti, imprimis hystericæ, tardius sepultura tradendi. Exploranda prius vita minima superstes per excitantia supra designata & fortiora, e. gr. per ferramentum candens plantis adptum, nec non per carptæ lanæ flocculum, cerei flammulam, nitidum speculum ad os naresque admota; per poculum aquæ, variis pectoris locis impositum; per repetitas pulsus explorationes, manum digitosque, ad cordis regionem, arterias carotides colli & illiacas ad femora descendentes, attente appdo & per v. f.

## OESOPHAGI MORBI.

INFLAMMATIO, AMBUSTIO, EXCORIATIO, ARDOR, DOLOR, quibus cremor lactis vel R. syrûp. papav.



aliquando vomitoria. vid. inserciones  
ibidem y. g. prout aeregete, nomen tunc  
et limit. & vid. ibidem



papav. alb. cremor. lactis aa. ℥j. vitell. ovor.  
 Nro. 2. aquæ rosar. ℥ij. ms. f. linctus, vel lo-  
 och mucilaginosum in ore tenenda & pedeten-  
 tim deglutienda, vaporesque emollientes me-  
 dentur.

SPASMI incautis anginam imponentes, pha-  
 ryngem occupantes, unde deglutitio impedita;  
 linguæ, colli rigiditas; suffocatio, sensusque palii  
 infixi: vel inferiorem partem gulæ afficientes,  
 unde deglutorum quidem progressus impeditus,  
 maxime circa cardiam, eorum & pituitæ rejectio,  
 cum nausea & tussi & dolore inter scapulas.

Csæ. Mobilitas nervorum hypochondriacis  
 & hysteriis, animi affectibus agitata, familia-  
 ris; saburra ventriculi; ejus vasorum infarctus;  
 vermes; refrigeratio; fluxus sanguinis suppressi;  
 læsio nervorum colli &c. M. M. varia, pro  
 causarum indole. Cathartica, ex elect. de man-  
 na; clysmata antihysterica, opiata, carminativa;  
 emulsio, ex ol. amygd. syr. de alth. bals. peruv.  
 vitell. ovi & aqua chamom. ppta &c. &c. Epi-  
 themata ex herb. aromaticis, theriaca, oleo macis  
 & spir. vin. camphor. ppta, pectori & spinæ dor-  
 si; cucubitæ nuchæ; empl. oxycroc. cum galb.  
 & ol. succin. mixt. plantis ped. imposita; frictio-  
 nes; vesicatoria; pediluvia. Jungenda sæpe v. s.  
 Profuerunt aliquoties ess. Galb. Bernh. micæ pa-  
 nis instillata in ore detenta & paulatim deglutita,  
 præmissio clysmate ex solutione asæ fœtid. nec  
 non pulvis scolopendr. vulg. ad ℥j. cum camph.  
 gr. x. conserva melissæ exceptus.


DEGLUTITIO IMPEDITA AB ATONIA PARALY-  
 TICA œSOPHAGI quoad vires exhaustis senibusque  
 familiaris. M. M. vide sub paralyssi.


ANGUSTIONES œSOPHAGI per tumorem, intruso stilo flexili, cui spongia alligata, detegendum; per steatoma, scirrhos, fungos, aneurisma, pinguedinem, frequentissime vero, ob glandularum œsophagi & vicinarum partium obstructionem, earumque exulcerationem, medellam vide sub gland. meseraic. obstructione, tuberculis & asthmate, a tumore colli. Quomodo œsophagus, a corporibus heterogeneis, sive figura acuta ipsi infixis, sive mole impactis, liberandus sit, vide Heisterum, acta Edinburg. & Tissot. avis au peuple. Huc pertinet quoque tumor colli singularis ex vitio ventriculi enatus; cujus pressionem. borborygmi ad stomachum descendentes & ructus subsequuntur; nec non appendicum ossis hyoidis luxatio, deglutitionem boli majoris insequens, contrectatione repetita ossis curanda; non minus prolapsus uvulæ, cujus aplici pulv. alum. aliquoties admovendus est. Quibus deglutitio plane impedita est, enemata nutrientia ex lacte cum furfuribus cocto, nec non gelatinosa crebro injicienda & nonnunquam alimenta instrumenti chirurgici ope in ventriculum compellenda.

## ABDOMINIS MORBI.

### *Digestio læsa.*

Csæ I) cruditates acidæ, alkalescentes, pituitosæ in ventriculo & duodeno, potissimum hospitantes. M. M. cruditates suis propriis remediis cicurandæ, diluendæ, incidendæ, earum acrimonia demulcentibus copiosis involvenda; & r. r. gantibus, sæpius vomitoriis eliminandæ, superingesto tunc potu tepido, tam largo, donec liqui-







liquidum plane insipidum rejiciatur; ingesta, variis cruditatibus lenocinantia, evitanda & ventriculus roborandus.

In specie *cruditatibus acidis* (unde sapor similis, voracitas, stupor dentium, pallor faciei, rejectorum color viridis, niger, odor acidus, stranguria) medentur, vomitorium. ℞. Tartari emet. a granis ij, ad grana v. solve in aquæ ℥xij. fumatur tertia vel quarta pars omni quadrante horæ, usque vomitus succedat, vel ℞. pulv. rad. ipecac. ℥i℥ cort. aurant. ℥ij. crem. tart. ℥℥. ebulliant cum aquæ font. ℥iv. colaturæ adde oxymell. scill. ℥℥. D. cochlearum; acidulæ Sedlizenfes; decoctum quass. foliis senn. infusum; magnesia ex sale amaro præcipitata & calcinata; pulveres absorbentes; aqua calcis, stomachicis amaris alterata. ℞. Corall. rubr. margarit. ppt. vel magnesiæ aa. ℥ij. N. M. ℥℥. sapon. venet. extr. rad. quassia, enulæ aa. ℥j. bals. peruv. q. s. ut f. trochisci pisi magnitudinis. Elix. aperit. Claud. gtts xl. pilul. ex sapon. v. & MPilul. viscerali conflata; Æthiops martialis cum pulv. rhei mixtus; amara, imprimis rad. quassia pro potu; acidulæ Fachingenses; decoct. cornu cervi, cui lixivium salis tart. instillari potest. Pro alimento, animalia, juscula carnis, cum vitello ovorum, pisces, carnes teneræ assæ. Nonnunquam obstructioni pancreaticæ & glandularum mesenterii, medendum. Quod si simul pituita peccat, cepæ, sinapi, raphanus rust. &c. sub cibus adhibenda. Huc pertinet fermentatio magna, in ventriculo, a corruptione fructibus horæis facta; spiritu sulphuris per campanam vel absorbentibus copiosis sedanda.

CRUDITATIBUS ALKALESCENTIBUS, BILIOSIS, OLEOSO - RANCIDIS, PUTRIDIS (unde oris amaror, siccitas; ructus olidi, fauces exurentes; sitis; nausea summa; vomitus; alvini fluxus biliosi; foetidi; urina acris flammea, foetida; cephalalgia &c.) lene emeticum, — elect. tartarifatum — ℞. Crem. tart. subtiliss. pulverifat. sri albi, panis biscoct. sriati aa. ℥β. cribratis omnibus adde spirit. vitriol. gtt. viij. fyr. rosar. solut. q. s. ut f. electuarium — vel ℞. Conserv. acetos. ℥j. pulp. tamarind. ℥β. spirit. vitriol. q. s. ad gratum acorem, syrup. berber. q. s. ad electuar. consistentiam; rheum; cassia; elix. acid. Dippelii, Halleri, vitrioli Myns. pulvis Fulleri. ℞. Cremor. tartar. ℥v. flor. balaustr. ℥j. spirit. vitrioli gtt. vj. ms. ferum lactis ope acetosellæ pptum, frigide & copiose exhibitum; nitrum cum stro mixtum; victus mere vegetabilis, fructus horæi, præparata hordei, oryzae &c. vide reliqua, quoad diagnofin sub cephalalgia biliosa & quoad curam sub cephalalgia fanguinea. *Cruditatibus vero ex abufu absorbentium terrestrium enatis, acida diu & tandem emeticum opponenda.*

CRUDITATIBUS PITUITOSIS, GLUTINOSIS ex temperie pituitosa; lingua glutinosa, substantia alba, lardum referente, obducta; sensu materiæ tenacis fauces obsidentis; appetitu dejecto; alvo tarda; ex effectu leni, aut nullo catharticatorum sat efficacium; urina tenui, limpida & inprimis ex rejecta materia peccante cognoscendis; scillæ ppta, pulveres ex sale med. rad. ari. scilla & elaeoffio cinamom. vel stomach. Birkmanni; saponis; aqua calcis, stomachicis incidentibus, radice seneg. rub. tinct. enulæ, pimp. alb. herb. marnu









marnubii alb. hyfopi alterata & ejusmodi clysteres opponenda; his præmissis, ad vomitoria, purgantia, inter quæ mixtura antihypochondriaca, omni bihorio-trihorio ad gtts 50-58. exhibita, præstat, & denique ad usum gummi gutt. quod bis, ter de die a granis v. ad x. cum manna propinatur, deveniendum. Hac methodo quandoque sat diu continuandum est, ob pituitæ, in canali alimentari ejusque cryptis, immo profundius latentis incredibilem copiam, ob ejus tenacitatem summam & ob incognitam dispositionem pituitam, & in ipso sanguine generandi. Nonnunquam reliquæ cruditates, pituitæ implicitæ sunt, acre illud viscidum ingenerantes, unde non tam aperte quidem, sed eo pertinacius vexant, & multum negotii faciunt. Hypochondriacus, alvi obstipationi &c. obnoxius, enematibus visceralibus, bis de die, diutius adhibitis & interpositis salibus digestivis, quandoque mixtura antihypochondriaca Hallensi, mucum stupenda copia & cum illo lapillos forma & colore calculis felleis simillimos, sed re accuratius examinata, ex saccharo, quod æger in deliciis habuit, & pituita conflatos, cum euphoria ano ejecit.

2) FIBRARUM VENTRICULI NIMIA LAXITAS, junctâ nonnunquam sensibilitate nimia, cruditatibus lenocinans & ex iisdem oriunda, nec non ex ventriculi repletionem ad crepaturam usque; ex Csis gener. 1, 2, - b - c - e - f - 3, 4, & præcipue 10, in specie ex dysenteria graviore prægressa, vel cohibita; ex abusu potus tepidi, venæ, mastupratione in prima juventute exercita; mercurio male adhibito; cathartice; venæsectionibus, opiatice & relaxantibus crebro usurpatis.

Sanatur evitando, corrigendo & eliminando  
 Csas & roborando nervos in genere & stoma-  
 chum in specie. Quod præstant præter supra  
 notata, pilulæ viscerales N. cum extr. aloes;  
 tinctura rhei Darelli cum extr. menth. spirituoso,  
 liquore terræ fol. tartari mixta, aqua menth.  
 cinamomi diluta; mars solubilis cum aequali por-  
 tione pulveris rhei mixtus & ad ℥ss. — ℥ij.  
 exhibitus; elixir. proprietatis, aperit. claud. sto-  
 mach. vien. Hoffmanni, cum aqua carminat. &  
 bals. vitæ combinat. elixir. Rob. Whytt. — R.  
 Cort. peruv. el. ℥iv. rad. gent. r. flav. cort. au-  
 rant. aa. ℥i℥ spir. vin. gall. ℥iv. digere per  
 sex dies, balneo arenæ, cola. — R. Herb. menth.  
 piperit. card. bened. aa. ℥i℥ asperulæ cum flo-  
 ribus ℥ss. flav. cort. citri flor. cassiæ cinamo-  
 mæ aa. ℥ij. incis. infunde aquæ destill. nerv.  
 ℥ij. stent in maceratione frigida, per 12. horas,  
 agitando sæpe vitrum; colaturæ ℥ij. exhibe,  
 ante epulas. — Vina medicata, ex rad. gent.  
 rubr. enul. zedoar. galang. cort. aurant. peruv.  
 Winteran. cascarill. ligno lentisci herb. menth.  
 piperit. card. bened. cent. sem. foenic. adjecto  
 tartaro solub. cum vino generos. frigide infusis,  
 sub epulis ad ℥iij. sumenda. elect. diateffaron;  
 rotulæ & morsuli stomach. Gaubii; mars solub.  
 cum elaeosfro cinamomi mixtus; acidulæ mine-  
 ral. martiales, pulvis roborans — R. Extr. cort.  
 peruv. cascarill. aa. ℥ss. vitrioli martis factitii  
 gr. viij. elaeosfri cinanom. ℥ij. ms. divide in  
 viij. partes — Elix. nervinum; myrrh. selectæ,  
 cinamomi, cort. peruv. rhei frustula crebro ma-  
 scata & deglutita. Pro potu decoct. cassiæ  
 lign.





lign. cort. aurant. citri rec. massichis &c. chalybeatum; vina meraca, oleosa, malvaticum, hungaricum, de mallaca, pontak &c. pro alimento cibi eupepti, zinzibere, pipere, N. M. panis biscoctus, semine fœniculi, carvi, anisi conditi; loco potus theæ, mane jentaculum hypochondriacis ordinatum & post prandium potus bischopp. externe epithemata nervina, infuso vinoso, herb. menth. piperit. card. bened. flor. cassiæ cinamomeæ; aurantior. virid. sem. carvi contus. imbuta, frigide abdomini appda; empl. stomach. —  
 ℞. Ladani mollis ℥i℥. thuris ℥i℥. cinamomi ol. nucist. express. aa. ℥ij. olei essent. menth. bals. tolut. aa. ℥j. ms. scrobiculo cordis & costis sinistris, infimis imponendum. Cataplasma theriacale; — ℞. Theriac. andr. ℥ij. balsam. nucist. ℥i. peruv. vel tolut. ℥i℥. mista, extensa ad alutam exhibe forma emplastri; ungtum ad atrophiam; frictiones aromaticæ; balnea frigida; motus corporis; perspiratio aucta, per motum corporis, equitationem &c. interdum jejunia & auxilia moralia, medicamentis præferenda sunt. Reliqua vide sub malo hypochondriaco.

3) FIBRARUM VENTRICULI SENSILITAS, IRRITABILITAS nimia ex Csa gener. 10, b. siti, siccitate, calore, febricula stipata, venæ Snem; saponacea acida, roob Ribes. &c. elect. tartarif. pulpam cassiæ; infus. malthæ hordei, decoct. hord. cum succo citri; serum lactis cum acetosella pptum & herba agrimonie, melissæ & asperuke alteratum, in progressu chalybeatum; aquam frigidam, tinct. ros. vel oleo vitrioli cum æquali portione spir. vini rectificatiss. edulcorato, acidulatam; dietam magis vegetabilem; enemata; ba


nea tepida exigit. Si denique amara, elix. stomach. vien. &c. locum habent, ea cum acidis min. elixirio acido Dipp. combinanda sunt.


*Senibus vero phlegmaticis, qui longo abusu spiritus vini rigiditatem fibrarum contraxerunt, usus spiritus adusti paulatim interdicens & ejus loco vini generosi modicus usus, cum condito zinzib. theriaca androm. diateffaron & spir. aperit. penot. permittendus, externe vero nunquam exulcerationes artificiales procuranda. Huc pertinet digestio laesa ex cerebri vitiis, cuius diagnosin & curam vide sub cephalalgia.*

4) LIQUORES DIGESTIVI INERTIA, DEFECTU, COPIA, SPISSITUDINE ET ACRIMONIA PICCANTES. *M. M.* viscerum abdominis, praecipue hepatis, pancreatis, glandularum meseraicarum vitiis & humorum cacochymiae variae succurendum; bilis defectus amaris supplendus, ejus fervori vero remediis sub 3, notatis consulendum. Sputatores salivam deglutiant. Profruit, acrimoniam cicurando *R.* Pulv. cort. sassafraf.  $\mathfrak{ss}$ . ol. still. sassafraf. gttm.  $\text{℥}$  ms. f. pulv. *D.* ante prandium & coenam unus. Citam quoque operam tulit, in malo rebeli cacochymico, vesicatorium dorso impositum, incredibilem feri acerrimi copiam educendo & exanthemata livida, copiosa provocando.


5) LAESIO NERVORUM PARTIUM REMOTARUM chirurgiam exposcit.


*SODA* sanatur cruditatibus acidis, alkalescentibus, acrimonia liquorum digestivorum, ventriculi ptoniae medendo. Sodae gravioris febricula, dolore fixo potissimum circa praecordia, anxietate summa











summa, nausea & vomituritione stipata Csas & curam vide sub diarrhœa dolorifica; ex infarctu vasorum ventriculi oriundæ vide suo loco.

**BULIMUS, FAMES CANINA** Csæ ventriculi irritabilitas nimia; cruditates atrabiliaria acidæ; liquorum digestivorum acrimonia, affluxus copiosior; vermes; linteria; paralysis pylori; ductus choledochi insertio in ventriculum &c. *M. M.* ex cognita causa petenda. Palliant interdum morbum alimenta ex leguminibus, decoct. chocolade cum lacte, amygdalæ, opiatî haustus. Proffit in malo inveterato, rebelli, decoctum limacum sub phthisi descriptum.

**VOMITUS** proritatur 1) a **CRUDITATIBUS VARIIS**, qui potu copioso aquæ repidæ promovendus; postea *M. M.* digestionî læsæ sub 1, 2, adhibenda, junctis semper enematibus. Huc pertinet *vomitus, anorexia, tussis ex corpusculis heterogeneis, plicis vel muco ventriculî irretitis.*

2) A **VENENIS CORROSEVIS**, quæ se manifestant hyperemesi, siti, ardore ventriculi, anxietate, doloribus abdominis enormibus, prostratione virium, refrigeratione extremorum, convulsionibus, facie hippocratica. *M. M.* Lacticia, emulsiva, olea blanda copiosissime sumenda; looch mucilaginosum ex ovo; linctus ex cremore lactis, syrup. alth. mucilag. sem. cydon. & aqua rosar. compositus, cum manna, denique cum opiatîs mixtus; clysmata oleosa. Eadem medela vomitus ex vermibus rodentibus & remediis drastîcis superatur. Si hæc resinosa fuerint, usus spirituosorum, vini hispanici, nullis plane interpositis aquosis, si vero mercurialia corrosiva fuerint, olei tartari per del. usus<sup>o</sup> sub-

jungendus. Mera mechanica, acus ferrea, cuprea &c. deglutita, aceti usum diuturniorem exposcunt. *Vomitus a carnibus, ovis putridis, barbi, lucii ovulis & similibus deglutitis, præmisso antiemetico river. potu tepido, copiosissimo & clysmate, acida exigit.*


3) A SERO ACRI RETENTO, RETROACTO M. M. vide sub cephalalgia serosa. Huc pertinet *vomitus, a diarrhœa suppressa, ortus, mixtura Riverii & clysteribus emollientibus, eccoproticis curandus.*


4) A PLETHORA VASORUM VENTRICULI, VEL EORUM INEARCTU, atrabiliaris, hæmorrhoidariis & gravidis potissimum familiaris. Cœ gener. 4, - b - c - d - & 1, - b - M. M. vide sub vomitu cruento. Eadem fere adhibenda est in *vomitu admodum dolente.*

5) AB INFLAMMATIONE INCIPIENTE VENTRICULI, post sumta acria; venena, potum frigidum, corpore exâssuante; post iram emetico tractatam; serum acre repulsum oriunda, ex doloris exacerbatione in ipso momento, quo aliquid ingeritur; singultu dolorifico; anxietate summa & febre suspicanda; pulsu vero non semper exploranda.

6) VOMITUS AB IRRITABILITATE NIMIA FIBRARUM VENTRICULI, VEL VOMITUS SINE MATERIA a levissima causa, imaginatione depravata, vel ex idea rei, quæ nauseam & vomitum sæpe excitavit prorsus, insanis quidem, hysteris, hypochondriacis & debilibus, ex causa gener. 10, familiaris, moribus hysteris, urina pallida, vertigine, borborygmis, ructibus, flatibus inodori-

ris,





ris, copiosis stipatus, compefcitur aqua frigida acidulata; infuso malthæ hordei; austeris; anodinis; quiete; clysmatibus, primo revellentibus, postea cum theriaca pptis; antiemetico Riverii, ex sale absynth. fumo sulphuris non expositi ℞ j. & succi limon. cochl. I. ppto sub actu effervescentiæ fumendo vel ℞ aquæ menth. aut theriac. compos. ℞ij. vini generos. rhenan. ℞i℞. succi citri rec. ℞℞. salis absynth. ℞℞. syrup. cort. aurant. q. s. ad gratiam, adjectis pro re nata aliquot guttulis laud. liquid. ms. D. pro aliquot haustulis — vel ℞. Infusi semivinosi meraci flor. calcatripp. ℞ I. succi limon. ℞i℞. salis absynth. ℞j ms. D. per vices, interpolitis liquore anod. min. Hoffm. elaeosfro menth. instillato, ex infuso frigido specier. nervin. cum syrup. citri mixto & frictionibus pedum & abdominis; tandem opio in forma pilulari. Externe cataplasmate theriacali vel ex pane, aut ejus fermento, vino generos. aceto, spir. vin. camphorato, herb. menth. rec. confusa, vel pulvere aromatico composito. Postea roborantia conveniunt, decoctum quasfiæ, cort. peruv. cascarill. &c. elixirio acido Dipp. acidulatum (vide digestionem læsam Nro. 2.)

7) EX ANIMI PATHEMATIBUS, SYMPATHE-  
TICUS & QUILIBET VEHEMENS INANIS VOMITUS  
eadem medela, mutatis mutandis, mitigatur. Con-  
sulendum simul morbo principi, hernicæ incar-  
ceratæ; obstructioni alvi, a scybalis; ileo; coli-  
cæ, stricture ductuum biliariorum; viscerum, præ-  
cipue pancreatis, hepatis & lienis obstructioni, tu-  
mori, inflammationi; cephalalgia; ischuria, capi-  
tis, diaphragmatis &c. vulneribus, contusionibus,  
ulce-

ulceribus, &c. confer *M. M.* sub colica, ileo &c.

8) A CARTILAGINE ENSIFORMI INTROPRES-  
SA. Cartilago, thorace in genua reflexo, aut di-  
gitis, aut cucurbitis coecis educenda: a *costæ*  
*luxatione aut stomachi hernia* ejus repositione.

9) A REFRIGERATIONE, alexipharmacis; o-  
piatis; epithematibus; balneis nervinis & apposi-  
tis lateribus calidis, plantis pedum sanandus.

10) A CALLO, SCIRRHO &c. *ventriculi, car-*  
*diæ, pylori* (cujus speciei suspicionem dant car-  
dialgiæ pertinaces, crebriores, sub actu digestio-  
nis evenientes; pondus loci; moderamen dolo-  
rum, a fortiori ventriculi compressione; tactus,  
& prægressa) diætâ molli, tenui palliandus.

11) A CARBONUM FUMO, acidis, aceti vapo-  
re sanandus, vide reliqua sub cephalalgia a nar-  
coticis.


12) A VECTIONE in curru vel navi præca-  
vetur pilula opiata, ex aqua cinamom. aut hau-  
stu vin. gallici rubri, aut tinctura martis aroma-  
tica, externe epithemate nervino.


VOMITUS HABITUALIS, usu emetici, mini-  
mis dosibus, crebro exhibiti, pulveris *N. M.* pa-  
rum tostæ, & glandis querni ex vitello ovi; a-  
qua menth. diluto; nec non rad. colomb. & extr.  
cicutæ &c. *Periodicus vomitus* fluxu hamor-  
rhoidum non raro curatus est.

## SINGULTUS.

A plerisque vomitus causis enascitur eadem-  
que *M. M.* curatur, a cruditatibus nempe va-  
riis








riis; vermibus; venenis; drasticis & insequente crustæ villosæ denudatione; a causa 3tia 4, 5, 6, 7, 8i, 9, & 10ma. Ad singultum, ab anomalia motuum, præter remedia, sub sexta specie vomitus recensita, laudantur, julapium moschatum; bolus & essentia antihysterici; præparata, ex rad. galang. ol. amygd. cum aliquot gtt. ol. destill. anethi & oleum essent. absynth. cajeput, animal. Dippel. sro instillata; carminativa cum opio; clysmata, nec non constrictiones abdominis per vincula; cataplasma theriacale ad digestionem læsam; cucurbitæ; inspiratio profundior; sternutatio. *Semum singultus, post diarrhœas, aut vomitiones possit anodina & enaleptica.*

## CARDIALGIA.

*M. M.* ex cognitis vomitus causis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10. petenda. Profuerunt quoque, cicuratis nempe & eliminatis cruditatibus, per cathartica, sub colica recensita, oleum cajeput. vel ol. essent. chamom. menth. animal. Dipp. in spir. æther. soluta, admixto spirit. salis ammoniaci dulci vel cornu cervi succinato; thea viridis ut masticatorium; bolus ℞. mosch. gr. viij. asæ fœtid. gr. v. camphor. mucilage gummi arab. subact. gr. ij. extr. menth. spirituosu ꝑ β. syrupo croci q. s. ex aqua nervina sumendus; essent. antihysterica; clysmata, ex speciebus nervinis, adjectis capitibus papav. & oleo lini ℞. lapid. cancr. ℥β. ol. destill. menth. cum sri ℥iij in elæosfrum redacti gtt. x. spirit. salis ammoniaci anifati ℥ij. laud. liquid. ℥β. syrup. menth. ℥j. aqua menth. ℥viiij. ms. *D.* omni biborio aut trihorio

horio cochl. ij. vel elix. nervin. vel electuarium  
 R. extr. cort. peruv. ℥β. menth. spirituosi  
 myrrh. aa. ℥ij. camphoræ paucillo gummi tra-  
 gacanthi subactæ ℥β. extr. glyzyrrh. ℥ij. mucil-  
 lag. sem. cyd. q. s. ut f. electuar. D. sexies de  
 die frustulum N. M. magnitudinis.

AD CARDIALGIAM, ex causis 2, 3, 4, miti-  
 gendam. R. Spec. nervin. recent. mj. lumbr.  
 terrestr. rec. Nro. 30. ol. amygd. d. rec. ℥β.  
 vini generosi ℥viiij. ms. coque ad vini consum-  
 tionem colaturæ cum forti expressione factæ ad-  
 de bals. tolut. ℥β. D. ℥j. ex jusculo. Externe  
 suadenda sunt cataplasmata emollientia, inter-  
 dum rubefacientia; linimentum ex ol. hyoscia-  
 mi ℥ij. ol. essent. menth. gtts viij. & spirit. salis  
 ammoniaci urinosi q. s. pptum; emplastrum. R.  
 Empl. de labdano vel diabot. ℥ijβ. camph. opii  
 aa. ℥β. - j bals. peruv. q. s. ut f. empl. scro-  
 biculo cordis & costis inferioribus, sinistris, dor-  
 sum versus imponendum, diu gerendum; balnea.  
 Simul victus curiosior & quies, instante paroxys-  
 mo, postea exercitatio imperandi. Evitandæ cau-  
 sæ occasionales, inprimis spirituum austerorum  
 abusus. *Cardialgiæ & colicæ ab obstructione  
 calculosa choledochi & ureterum*, curam vide  
 sub ictero & nephritide; *verminosæ* vide sub mor-  
 bis infantum. *In cardialgia hysterica, spasti-  
 ca, sæpe icterum transitorium causante*, sequens  
 formula semper probati usus fuit. — R. Camph.  
 gr. x. mucilag. gummi arab. q. s. aqæ foet. ℥β.  
 extr. lumbr. terr. ℥j. ol. destill. menth. gtts.  
 vj. ms. f. pilul. gr. j. pond. D. omni trihorio  
 Nro.





Nro. 4. -- 6. Exasperatur sæpe cardialgia vel minima dosi spirituosorum, pulverulentorum & salinorum.

## COLICA.

Cæsæ sub digestionem læsa & vomitu maximam partem enarrata sunt.

M. M. gener. clysmata emollientia, cum nitro & melle, vel electuario lenitivo; aut ex sero lactis cum floribus chamom. & cremore tartari; cathartica blanda, pulpa cassiæ, cum electuario de manna mixta, vel emulsio ex ol. amygd. syrup. dialth. aa. ℥j. camph. ℥j mucilag. gummi arab. q. s. mannæ, pulp. cassiæ aa. ℥i. liq. terræ fol. tartari ℥ij. & infus. spec. nerv. ℥xij. parata, crebro, ad cochl. ij. sumenda; tinctura rhei Darelîi cum mixtura Riverii, liquore anod. min. & aliquot gtts laudani liq. mixta; acidulæ Sedlizenfes, cum vel sine lacte pro sordium accumulatione diutius usurpandæ. Pro potu infus. meracum rad. liquiritiæ cum pauxillo sem. anisi; emulsiones, decoct. avenæ, cum fol. alth. flor. chamom. samb. semine cydon. lini, tamarindinum, large sumenda. Externe cataplasmata emollientia, fofus: R. Flor. chamom. roman. melilot. aa. mj. bacc. lauri. sem. carvi, lini, foenu græc. capit. papav. alb. aa. ℥j. coque ex lactis q. s. per  $\frac{1}{4}$  horæ colaturæ fortiter expressæ ℥ iv. admisce saponis venet. ℥ß. croci pulv. ℥ij. s. pannus laneus hoc liquore bene imbutus, mox expressus imponatur universo ventri ac quovis bihorio renovetur: Super applicetur vesica

vesica fuilla, oleo humectata: ungt. alth. cum camphora in eff. galb. solut. & pauxillo olei chamom. essent. &c. epithema ex infus. spec. nervinar. saturatissimo, cum spiritu salis ammoniaci mixto; Inseffus vaporosi; pediluvia; balnea; epispastica ad pedes; vesicatoria; alvo nihilominus pertinaciter clausæ, enema ex jusculo pingui cum infusi croci metallor. ℥ij. vel ex foliis aut fumo tabaci aptur. Dolor immanis, denique opium, præcipue in clysteribus; plethora vero & instans inflammatio, quæ nonnunquam pertimescenda est, v. s. repetitam & reliquam *M. M.* antiphlogisticam exigit. Superato dolore, tonica conducunt. Cfr. *M. M.* digestionis læsæ & cardialgiæ.


*M. M.* SPECIALIS COLICÆ FLATULENTIÆ ex ingestis fermentantibus, flatulentis, post evacuantia rhabarbarina; remedia carminativa blanda; infus. specier. nervin. elixir nervinum. Externe spirituosa.


COLICÆ BILIOSÆ, PITUITOSÆ, AB ACIDO diagnosin & medelam vide sub cruditatibus & cephalalgia biliosa.

AD COLICAM PITUITOSAM ex pituita vitrea, dolorem contumacem, gravativum, pali infixi speciem referentem, præ aliis emulsio gummi ammoniaci laudatur, junctis clysteribus viscerabilibus.

COLICÆ a VENENIS DRASTICIS & INDE AB-RASO MUCO, resina jalappæ &c. & ab acubus &c. deglutitis. *M. M.* vide sub vomitu & cardialgia.







COLICÆ SPASMODICÆ a SERO ACRI ARTHRITICO SCORBUTICO &c. *retento, retroactō.* M. M. vide sub cephalalgia serosa & colica saturnina. Præter clysmata, fomenta balneaque mollia, nunquam v. s. adhibenda. Conferunt quoque flores sulphuris, cum syrup. diacod. mixti, ex infuso chamomill.

COLICA VERMINOSA ex dolore fugaci magis, rodente, pungente, & a loco in locum serpente, dejectionibus alvinis grifaceis nocturnis, junctis reliquis sub vermibus notatis signis arguenda, interdum lene vomitorium; cathartica, clysmata oleosa; succum limon. cum ol. amygd. decoct. rad. gram. flor. chamom. cum mercurio vivo infusum & cum manna & syrupo persicor. mixtum; externe petrol. &c. exigit.

COLICA AB ANOMALIA MENSIIUM, HÆMORRHOÏDUM v. Snem, diluentia, demulcentia, emulsiones nitratas, lac cbutyratum, cataplasmata, clysmata mannata & fomenta oleosa, vide cardialgiam spasmodicam & catamenia dolorifica.


COLICÆ a FIBRARUM LAXITATE, *sensibilitate*, ex *levissima causa recurrentis* medelam vide sub digest. laxa. Valent imprimis infus. cort. peruv. cum specieb. nervin. pptum (vide malum hypochondriacum) adjecto extracto menthæ spirituosæ, liquore anod. min. vel spiritu nervino; epithemata spirituosæ. Vehemens inde *enata colica spasmodica vel sine materia* opiatibus mitiganda (vide symptomata hysterica).


COLICA CHRONICA, a sanguinis stagnatione; glandularum tumore; scirrho; cancro  
F aliis-

*aliisque intestinorum & viscerum vicinorum vitis* diæta blanda, tenui, lactea pallianda & morbo principi consulendum.

COLICÆ CONSENSUALI a calculo renum, felleo moto &c. M. M. vide suo loco.

COLICA SATURNINA, PICTONUM doloribus atrocibus abdominis, ad lumbos & dorsum serpentibus; alvi obstipatione pertinaci; scybalorum durorum, stercori caprino similibus excretionibus; ventris retractione spasmodica & artuum semiparalyti incedens; a vini lithargyrio fucati, aquæ, alimentorum, in vasis stanno obductis, cupreis, plumbeis, diu fervatorum; vini pomacei, in ejusmodi vasis ppti & medicaminum saturninorum usu; fumis saturninis, arsenicalibus deglutitis; hinc metallurgis, pictoribus, figulis & futoribus corium cerusa fusa dealbantibus, familiaris; sæpius ab ingluvie acidorum; a miasmate arthritico, scorbutico, febricoso intus retento, vel repulso oriunda, sanatur enematis; cathartics lenientibus, sub methodo generali descriptis; potissimum emulsione ex ol. amygd. dulc. & interdum vomitorio leni, mucum tenacem eliminante; potu demulcente, emolliente, copioso; mucilaginoso; emulsionibus, sæpe camphoratis; butyro cacao; Pilulis seq. ℞. Petrolei veri ℥j. castorei q. s. ut f. pilul. gr. iij. D. omni trihorio pilulæ tres, subjunctis semper remediis visceralibus, extr. tarax. &c. pilulis visceralibus N. & clysteribus quotidianis. Tandem aluminis usus tentandus. — ℞. Aluminis, stri vel gummi arab. aa. ʒβ. -- .i ms. D. ter de die. Externe cataplasmatibus emollientibus; fomentis oleosis; balneis copiosis, nonnunquam vesicatoriis





riis & post v. s. quandoque opiatīs (vide arthritidem anomalam & cephalalgiam serosam). Eandem fere *M. M.* exposcit *colica ab hernia, plus minus incarcerata*. Simul prolapsus, præmissō clysmate, ex decoct. spec. emoll. & pulv. scill.

℞. parato, cataplasmate cum aqua vegeto-minerali ppto vel fomentatione frigida ex aceti opt. ℥. i. nitri ℥j. salis ammoniaci crudi ℥ij. & aquæ font. ℥. x. conflata, sufficienter. fctus, leni, indefessa sensimque aucta pressione, reponendus, vel ad herniotoniam deveniendum. In gangrænam tendenti est. Galb. Bernh. &c. adplda.

## ILEUS

A plerisque, supra & sub alvi obstipatione recensitis causis, crebrius ex hernia, ex ingestis siccis, constringentibus, in crassantibus, saturninis aliisque venenatis; a vermibus, invaginationem excitantibus; scybalis induratis, accumulatis enascitur. Adhibenda *M. M.* general. colicæ. Vomitus antiemetico Riverii, denique pilula opiata cohibendus, tum alvus aperienda cathartics, emollientibus, adjecto interdum sale glaub. &c. Oleo lini recensiter expresso, ad ℥viii, cum corevisia calida, ea quidem lege adhibendo, ut omni hora & post alvi laxitatem, omni bihorio cochl. i. deglutiat̄ur & enematibus (in decocto flor. malvæ, chamom. melilot & fol. atriplicis rec. infunde, per bihorium fol. rutæ rec. mj. in colatur. ℥i℥. dissolve salis ammoniaci ℥℥. adde ol. nucum & mellis mercurial. aa. ℥ij. divide in duo clysmata, intra bihor. injicienda) vel ex ju-

sculo pingui cum infuso croci metall. denique ex fumo tabaci pptis. Quibus opiata, potus demulcens copiosus, balnea emollientia & reliqua externa subjungenda. Inflammatio v. Sine avertenda. Causarum diversitas vero aliqualem hujus methodi mutationem facit.


ILEUS a TUMORE, SCIRRHO, &c. intestina angustante, comprimente vix sanabilis; *ex spasmodicis vero hysteriis* curationem colicæ spasmodicæ exigit. Ileus pertinax, in hysterica, vomitu stercoreo, prolapsu uteri, ob tumorem abdominis, fere inflammatorium, haud reponendo aliisque symptomatibus pessimis stipatus, quibusvis optimis, in- & externis incassum tentatis, tandem pilulis ex asa foetid. camphora &c. (vide sub cardialgia) parvis, sed sæpe repetitis dosibus exhibitis, alvum brevi laxantibus, curatus fuit.


## ALVINI FLUXUS.

Csas diarrhœæ, vide sub digestionem læsa N. 1. & 2. quo referenda, ingesta fermentantia, irritantia, venenata, mercurialia; vermes; transpiratio suppressa; adeps fusus, nec non sanguis aquosior; viscerum vitia; cacochymia varia cfr. Csas gener. 4 & 9. unde diarrhœa arthritica, scorbutica, venerea &c.

*M. M. generalis.* Diarrhœa, sordes viscidas, in intestinorum plicis diu & pertinaciter hærentes; humores cacochymicos varios, luxuriantes, versus intestina delatos, vel critice huc determinatos eliminans & vices lochiorum, fluoris albi, hæmorrhoidum, mensum, febrium intermitt. recidivarum, suppressarum, cum euphoria supplens,  
hinc







hinc a morbis fonticis, inprimis capitis præfer-  
vans, eosdemque sanans, non cohibenda, quam-  
diu præternaturalia, biliosa, æruginosa, nigra, pi-  
tuitosa, admodum foetida, purulenta &c. egerun-  
tur, febris abest atque appetitus viresque vigent;  
sed potius artis admuniculis, vomitoriis, catharticis  
lenibus; potu blando, acre diluente, involvente,  
copioso; sero lactis; decocto oryzæ &c. enemati-  
bus emollientibus & remediis, conatus irritos,  
spasmos, dolores sedantibus, facilitanda, promo-  
venda; denique cruditatibus expurgatis & debili-  
tate torminibusque urgentibus, a lenientibus, ro-  
borantibus, ad opiata, adstringentia devenien-  
dum. Quo spectant, rad. ipecac. tartari emetici  
solutio, rhei ppta &c. juncto interdum sale am-  
mon. interpositis diluentibus, demulcentibus,  
mucilage gummi arabici, sem. cydon. emulsio-  
ne cum gummi arab. ppta. decocto furfur. le-  
niter tostorum, cum fol. malvæ, flor. chamom.  
&c. clysteribus similibus. Subjuncto vesperi  
opiato. Porro nux moschat. cassia lignea; cina-  
mom. cort. cascarill. peruv. gummi mastich.  
sulphur crudum; rhabarbarum tostum cum tan-  
tillo opii; lysimachia; simaruba; serum lactis  
aluminatum Mülleri (vide hæmorrhag.) ℞. Tin-  
ctura rhei ℥ij. — iij. salis mir. glaub. ℥ij. - ℥℞.  
mucil. gummi arab. ℥ij. — iij. laudan. liq. Sy-  
denh. gtt. iij — viij. aquæ millefol. chamom.  
menth. aa. ℥j ms. D. per vices, experti usus  
formula, cui interdum subjunge sequentes —  
℞. Extr. cort. peruv. ℥iij. cascarill. ℥j. ligni  
campech. glyzirrh. aa. ℥ij. mucilag. sem. cydon.  
q. s. ut f. elect. D. bis quater de die ℥j. vel ℞.


terræ japon. ℥ij. decoct. quass. ℔. i. coque ad  
 consumptionem 4tæ partis; decantato adde aquæ  
 cinamom. cyd. syrup. cydon. aa. ℥ij. dosis cochl.  
 i. omni hora vel ℞. pulv. rad. bistort. baccar.  
 myrti aa. gr. xij. ms. f. cum roob cynosb. bolus.  
 Decoctum a Fullero laudatum. ℞. Diascord. frac.  
 ℥℔. crustam panis albi inferiorem coque ad duas  
 tresve ebullitiones in aquæ ℔j. sub finem adden-  
 do sri ℥℔. colaturæ per pannum adjice aquæ  
 cinamomi lactæ ℥ij. D. per vices. Rad. colum-  
 bo a ℥℔. ad ℥ij. omni 3-4 horio. Externe ol.  
 nucist. expr. mastich. &c. epithemata sub colica  
 ordinata; fascia roborantibus imbuta, ventrem  
 constringens; cataplasma theriacale ad digest. læf.  
 Nro. 2. indusia lanea, massiche &c. perfumiga-  
 ta; vesicatoria, cfr. medelam vomitus cardiacg.  
 colicæ. Si febris inflammatoria diarrhœam co-  
 mitatur, v. s. aliaque antiphlogistica simul adhi-  
 benda. Pro nutrimento sint cibi pauci cupepti,  
 juscula, cremores ex avena &c. Transpiratio &  
 diuresis promovendæ & pedes pannis laneis cali-  
 dis fovendi.


M. M. specialem diarrhœæ a *variis cru-  
 ditatibus, hinc biliosæ, mucosæ, &c.* vid. sub  
 digest. læf. Nro. 1.

AB INGESTIS ACRIBUS DRASTICIS, VENENIS  
 &c. unde hyperemesis & hypercatharsis; vide sub  
 vomitu Nro. 2.

A VERMIBUS sub colica verminosa.

A TRANSPARATIONE SUPPRESSA vide sub vo-  
 mitu Nro. 9.





DIARRHŒA a MERCURII ABUSU, COLLIQUATA emollientibus, demulcentibus, opio in potu & clysteribus sanatur.

A DIATHESI SUBPUTRIDA SANG. ex ructibus putridis; fœcibus fuscis, pessime olentibus; urina turbida, fœtidissima; meteorismo; lingua plumbea quasi; virium defectu; siti mediocri &c. cognoscenda, sero lactis aluminato diacodiatu Mülleri — R. Aquæ flor. rhœad. ℥. i. syr. diacod. ℥iij. spirit. sulph. p. c. ℥j. ms. D. omni bihorio aliquot uncia, interpositis aliquoties de die, laud. liq. gttis x-xx.

A CACOCHYMIA VARIA & VISCERUM VITIIS remediis variæ causæ propriis, mox antiscorbuticis, mox antifiphyliticis, mox splanchnicis &c. & externis revellentibus; junctis demum roborantibus (vide arthritidem anomalam). Curam palliativam *diarrhœæ pessimæ, phthificis, hydropticis, scorbuticis supervenientis* vide sub phthisi. Vir diarrhœa ad quavis rebelli, per decem annos pessime vexatus, tandem cruenta, emaciatus, morti proximus, decocto limacum, subjuncto cortice cascarillæ, sanitati restitutus est.

*Dispositio ad diarrh.* ob intestinorum laxitatem & sensibilitatem, ex levi causa, animi pathemat. refrigeratione pedum &c. repullulantem, hypochondriacis, hysteris familiaris, corrigitur remediis roborantibus, in- & externis sub M. M. gener. notatis, quo imprimis indusia lanæ & fascia referenda sunt, cfr. medelam digest. lat. Nro. 2.

## LIENTERIA


Vel dejectio celer ciborum & potulentorum indigestorum & crudorum.


Cæsæ ventriculi & intestinorum laxitas summa, ex purgantium, potus tepidi, spirituosus abusu; dysenteria male curata &c. &c. ex liquorum digestivorum inertia & acrimonia cfr. Cæsæ gen. Nro. 10. M. M. vide sub digest. l. 2 & 4. Laudant quoque lac ebutyratum vel serum lactis aluminatum, vel chalybeatum, cum vitellis ovorum mixtum; pulverem N. M. cum vitello ovi frixi, ex decoct. baccar. juniperi. gland. querc. tostarum, cum aqua calcis parato: Elect. ex extr. ligni campechens. cort. cascarill. rad. quass. fol. menth. spirituosus, syrupo cinamomi & mucilage cydon. — R. Pulv. cort. simarub. ꝑ℞. iud. liq. Syd. gtt. iij. ms. & divide in doses sex, sumatur omni trihorio pulvis unus. — Frictiones abdominis & spinæ dorsi cum balsam. nucist. *symptomata* a scorbuto, lue venerea, ulcere ventriculi &c. ex aphtis, vermibus prozitata, medendo principi morbo curatur.


## COELIACUS FLUXUS.


Seu diarrhœa chymosa, dejectio nempe sat frequens & copiosa excrementorum plerumque valde fetentium, coloris ut plurimum albicansis aut cinerei. Cæsæ intestinorum potius, quam ventriculi laxitas, in ipsis hospitans fermentum, liquores digestivos corrumpens, & pulvis absorbentium nimis subtilis & copiosus deglutitus, mucos intricatus, orificia vasorum lacteorum & cholicochi oppilans; sæpius glandularum mesenterica-











raicarum obstructio. *M. M.* vide sub digestionē leſa Nro. 1 & 2. & sub obstructione glandularum meſeraicarum, non omiſſis frictionibus aromaticis ſedulis abdominis.

**DIARRHOEA CRUENTA** ſive dejectio ſanguinis ſinceri, ſine dolore & tenesmo. Cſæ plethora, ex diæta lauta; ex evacuationibus ſang. ſuppreſſis, neglectis; ſanguis nimis aquoſus; laxitas arteriarum meſenterii; obstructio viſcerum abdominalium; diarrhœa biliſa male tractata. *M. M.* Inter alia, lac ebutyratum, vel ſerum lactis aluminatum; acidulas martiales cum lacte; decoctum cort. peruv. caſcarill. cum pauxillo gummi arab. ejuſmodi clyſteres & pulverem ex ſimarub. ſub lienteria deſcriptum expoſcit; interpoſitis quandoque rhabarbarinis & ſi ſaburra peccat, leni vomitorio caute adhibito. Plethoricis vero hæc ſape ſalutaris evacuatio non tam facile cohibenda, ſed v. ſ. & temperantibus potius diminuenda. Poſtea curatio eo dirigenda, ut viſcerum obſtructiones, ſi in culpa fuerint, tollantur & fluxus ſang. ſuppreſſi revocentur.

**HEPATICUS FLUXUS** vel dejectio ſeri ſanguinei, loturæ carnis inſtar, ex iisdem fere cauſis oritur & eadem *M. M.* ſanatur.

**PERIODICUS, FEBRILIS, EXCEDENS** quantocyus cort. peruv. cohibendus. —

**EX HEPATIS ULCERE** propullulans incurabilis eſt.


**DIARRHOEA CRUENTA**, quæ autumnō pomis admodum divite graſſata eſt & ſang. aquoſi copioſa excretionē, quandoque vomitu cruento, doloribus & tenesmo mitioribus, quam in dyſen-


teria, concurrente interdum febre catarrhali stipata, permultos vexavit, qui fructibus horæis abusi sunt, hisque sibi sang. dissolutionem & primarum viarum flatulentiam & atoniam contraxerunt, sequentibus — R. Tinct. rhei ℥ij. - iij. mucilag. gummi arab. ℥ij — iij laud. liq. Syd. gtt. v - viij. aquæ millefol. menth. chamom. aa. ℥j. ms. D. per vices potuque demulcente, copioso; clysteribus similibus; subjunctis tonicis, brevi sanata est.

DIARRHŒÆ INFLAMMATORIÆ M. M. vide sub dysenteria inflammatoria.

DIARRHŒA PURULENTA, ULCEROSA Cæsæ abscessus, ulcera intestinorum vel viscerum remotorum, ex eorum inflammatione aut dysenteria prægressis enata. M. M. victus tenuis, vegetabilis. Decoct. vulnerar. cum limacibus & lacte pptum, admixto, agitando balsamo de copaiba; lac ebutyratum; decoct. cort. peruv. cum melle & liquamine myrrh. — R. Terebinth. ven. ℥j. mucilag. gummi arab. ℥iij, mellis ℥j. syrupi papav. alb. ℥℥ diligenter in mortario tritis: adde emulgendo infusi virg. aur. ℥℥. D. vasculatim. — Clysmata. R. Flor. chamom. mij. cum lactis s. q. coque, vase clauso, per 1/4 hor. colaturæ ℥viij. admisce sub sedula agitatione balsami de copaiva ℥ij, mellis ros. ℥ij. injiciatur ter, quater de die. Cfr. medelam phthiſeos exulceratæ.

AD DIARRHŒAM DOLORIFICAM, cum tenesmo, ab abraſo muco, erosione & excoriatione ventriculi & intestinorum per saburram acrem, roden-







dentem, post sumta venenata, drastica; iram vehementem; frequentem; choleram; dysenteriam, quandoque post cessationem hæmorrhoidum in senibus. Conferunt demulcentia, diluentia copiosa. ℞. Cerae flav. ℥j. pulv. gumini arab. ℥ij. ms. & affusa patica aqua subige & ultimo adde bals. peruv. gtts xv. siri alb. ℥ss. syrup. papav. alb. ℥j iterum misce & subige D. tribus vicibus ex decoct. alth. chamom. & millefol. clystma — ℞. Sem. lini ℥ij. capit. papav. Nro. 1. coque per 1/4. hor. in f. q. aquæ colat. ℥ss. adde vitell. ovi.

## CHOLERA.

Cæsæ vomitus & diarrhœa summo impetu simul agentes, sapius bilis aeris, ex irritatione nervorum, calore æstatis &c. magis magisque corrosiva. Vide Cæsæ gener. Nro. I, a-b-c- & 4, a-e-f. M. M. materia peccans acerrima cito temperanda & ad exitum disponenda & evacuatis cruditatibus, motus excedentes, opiatis sopiendi, denique roborantia adhibenda. Huc faciunt: Emulsio mannata ad colicam; cremores hordei &c. decoct. panis avenæ vel furfurum leniter tostorum, cum pauçillo lactis vel ejus loco syrupo berberum mixtum; decoct. hordei cum capitibus papav. flor. chamom. & crocopptum; acidulae Selteranae, Embenses cum lacte, lac ebutyratum, cum mucil. sem. cydon. vel ovis sorbilibus; Emulsiones; juscula pulli exenterati & sem. 4. frigidis repleti, pedetentim quidem, sed largissime, in balneo emoll. tepido, haurienda; interposito sepe antiemetico Riverii; ge-  
latina


latinae linctusque ex cremore lactis, syr. diacod. vel alth. mucilag sem. cydon. & aqua rosar. pptus, exulcerationi optime consulens; remedia sub vomitu Nro. 2. & cardialgia spasmodica recensita; clysmata ex oleis chamom. millefol. & liquamine verbasci ppta, omni bihorio & abdomini olea similia aut cataplasmata appda. Absint stimulantia, calida.


Plethora, pulsus durus & dolorum atrocita v. Snem ingesta a- & dispepta & colluvies verminosa cathartica, pro diversis cruditatibus, varia, ex rheo, tamarindis & magnesia ppta, cumque pauxillo opii combinata, præmissa mixt. Riverii, initio morbi & viribus constantibus exigunt. Cfr. curationem diarrhææ. Morbo superato roborantia, rad. columbo a ʒʒ. ad ʒij. omni trihorio sumenda; acidulæ martiales, cum lacte; serum lactis chalybeatum cort. peruv. conducunt. *Periodica* cito cort. peruv. cum pauxillo opii cohibenda. *Epidemicæ* medela parum a præcedenti recedit.

Cholera epidemica, febre vehementi stipata, mulieres potissimum infestans, infuso laxat. vien. cum aqua menth. camph. & sale absynth. succo citri saturato, mixta, & infuso largo rad. liquirit. & flor. sambuci, junctis antihysteriis in- & externis, sæpe feliciter superata est. *Hysterica sine materia & sicca* curam colicæ spasmodicæ exigit.

## DYSENTERIA

Vel dejectio frequentissima, torminosa, tennesiacædes materiæ mucosæ, filamentosæ, puriform-







formis, cruentæ, biliosæ, varii coloris, putridæ, cadaverosæ, febre plus minus sensibili stipata, sub finem æstatis ferventis, post crebriores aëris mutationes, ex calido in humido-frigidum & post sumta alimenta rubigine infectata maxime eveniens; contagiosa, epidemica. Præcavetur evitando Csas gener. Nro. 1, a-b-c-4, 5, a-refrigerationes, imprimis nocturnas, contagium ex ægroti halitu & excrementorum exhalatione facillime contrahendum, usurpando acefcentia; vinum; mixturam antiemet. River. cum mixtura simplici; rheum cum cremore tartari; emeticum, subjunctis theriaca & externe frictionibus aromaticis. Optime in *biliosam plus minus putridam, inflammatoriam, malignam & in chronicam* distinguitur.

M. M. BILIOSO - PUTRIDÆ, quæ multo frequentior est & ex febre bilioso-putrida prægressa, vel intercurrente ejusque symptomatibus, junctis illis dysentericæ propriis, horripilationibus recurrentibus, subsequente calore, lassitudine, gravitate artuum dorsi & lumborum magna, cephalalgia, nausea, siti, sapore amaro, vomitu bilis, interdum vermium, euphoria ex vomitu, facie plerumque pallida, & excrementorum conditione &c. cognoscitur. Initio emeticum, superingesto potu largo, tepido, infusi flor. chamom. verbasc. sem. lini &c. non obstantibus graviditate, hernia haud reponenda & inflammatione, exhibendum. R. Aquæ flor. chamom. ℥vj. pulv. rad. ipecac. ℥β. tartari emet. gr. ij-iv. ms. D. omni 1/4 horæ cochl. ij. donec optatus effectus sufficienter eveniat, vel — R. Mann. ℥β. pulp. cassiæ ℥iij. vel potius extracti cassiæ ℥β. liquefiant

feant in decoct. hordei ℥ i. colaturæ adde tar-  
 tari omet. gr. iij. syr. diacod. ℥℥ D. omni 1/2  
 horæ ℥iv. cujus vomitorii, & in progressu mor-  
 bi reiterationem, ingluvies, nausea, sapor ama-  
 rus, vomitus, anxietas, &c. suadent; subjun-  
 genda decoct. hordei, in cujus mensura crem. tar-  
 tar. ℥j. & syr. herber. ℥iij. solvantur, per no-  
 stem consumenda; subsequente die tamarind.  
 ℥iij. in aquæ ℥ j. coct. aut haustus ex pulpæ  
 cassiæ, mannaæ aa. ℥j. salis Sedliz. ℥j. - i℥. &  
 s. q. aquæ chamom. pptus, vel anima rhabarb.  
 (quæ fibræ laxæ, vomituriensibus, & sub finem  
 morbi magis proficua est,) cum pauxillo laud.  
 liq. Sydenh. combinanda, si dolore inde exasper-  
 rantur. cfr. M. M. gener. colicæ. Quorum pur-  
 gantium & quotidianam repetitionem, dolorum,  
 tenesmi, febrisque pertinacia, excrementorum &  
 virium conditio determinant. Interponenda a-  
 cre involventia, dolores lenientia, decocta fur-  
 fur. leniter tostorum vel oryzæ, rad. alth. scor-  
 zon. raparum, cornu cervi, florib. chamom. ro-  
 sar. millefol. verbasci, femine lini, cydonior.  
 contus. & pauxillo lactis alterata, aut oxymelle  
 acidulata; emulsiones; serum lactis; lac ebuty-  
 ratum & similia copiosè hausta; emulsio arabica;  
 ejusmodi clysmata, adjectis oleo chamom. & ver-  
 basci; species diatragacanth. frig. recentissimæ;  
 pomorum excavatorum, gummi arab. & masti-  
 che repletorum & sub cineribus assatorum pul-  
 pa. Nonnunquam anthelmintica adjicienda.  
 Putredinis major gradus cort. peruv. & rad. ser-  
 pentar. virgin. exigit. Externe conducunt ca-  
 taplasmata, inunctiones, balnea, pediluvia, vesi-  
 catoria. Alimenta sint ex acescentibus, fructus  
 horæi,








horæi, cremor hordei &c. aliena alkalescentia, obstipantia, calida, acria. Regimen sit temperatum, aer purus suffimigiis corrigendus; at-  
 vum exonerantibus vas infuso flor. chamom. &c.  
 tepido repletum supponatur. Cfr. *M. M. cho-  
 lera*. Denique materia peccante eliminata, opiata,  
 roborantia, theriaca, diascordium, aqua calcis gum-  
 mi arabico alterata, cort. peruv. cascarill. rad.  
 colombo &c. caute adhibenda. Eandem fere  
 medelam *dysenteria miliaris* exigit.

LEVIOR SPECIES, BILIOSA, MINUS PUTREDI-  
 NOSA vel ex materia catarrhali, pituitosa, acri,  
 varioque cacochymico fermento, non putrido qui-  
 dem, sub alia conditione vero febres epidemicas  
 excitante, intestina versus determinatis, enata il-  
 lisque potissimum familiaris, qui abusu fructuum  
 horæorum canalem alimentarem debilitant, ibi  
 fermentum acre ingenerant & massam sanguinis  
 nimis tenuem reddunt, cito sæpe sanatur, mane  
 mannam vel rheum, in decocto coffeæ tenui, lar-  
 go, cum lacte mixto, per 3-4. diès, interdium e-  
 mulsiõnem arabicam, vel ex oleo amygd. d. syr.  
 diacod. vel alth. aquis rosar. cinamomi & potu  
 demulcente paratum vel decoctum saturatum pe-  
 dum vitulin. oryzae, adjecto pauxillo aquæ cal-  
 cis aut aquam cum pane tosto, florib. rosar. rubr.  
 & capit. papav. infusam; vesperis vero, post clys-  
 ma demulcens injectum, opium; denique 4to,  
 5to die, cort. peruv. cascarill fumendo.

DYSENTERIA OB DIATHESIN PHLOGISTICAM,  
 PLETHORAM & BILIS FERVOREM, INFLAMMATO-  
 RIA febre vehementiori; pulsû duriore, celeri,  
 nonnunquam vero humili, debili, sibi subobscurè  
 dissimili; dolore continuo, acuto, feroci, magis  
 fixo,



hordei, cremor hordei &c. aliena alkalescentia, obstipantia, calida, acra. Regimen sit temperatum, aer purus suffraginis corrigendus; album exonerantibus vas infuso flor. chamom. &c. tepido repletum supponatur. Cfr. *M. M. cholerae*. Denique materia peccante eliminata, opiata, roborantia, theriaca, diascordium, aqua calcis gummi arabico alterata, cort. peruv. cascarill. rad. colombo &c. caute adbibenda. Eandem fere medelam *dysenteria miliaris* exigit.


LEVIOR SPECIES, BILIOSA, MINUS PUTREDINOSA vel ex materia catarrhali, pituitosa, acri, varioque cacoehymico fermento, non putrido quidem, sub alia conditione vero febres epidemicas excitante, intestina versus determinatis, enata illisque potissimum familiaris, qui abusu fructuum horarum canalem alimentarem debilitant, ibi fermentum acre ingenerant & massam sanguinis nimis tenuem reddunt, cito saepe sanatur, mane mannam vel rheum, in decocto coffeae tenui, largo, cum lacte mixto, per 3-4. dies, interdiu emulsionem arabicam, vel ex oleo amygd. d. syr. diacod. vel alth. aquis rosar. cinamomi & potu demulcente paratum vel decoctum saturatum pedum vitulin. oryzae, adjecto pauxillo aquae calcis aut aquam cum pane tosto, florib. rosar. rubr. & capit. papav. infusam; vesperi vero, post clystera demulcens injectum, opium; denique 4to, 5to die, cort. peruv. cascarill sumendo.


DYSENTERIA OB DIATHESIN PHLOGISTICAM, PLETHORAM & BILIS FERVOREM, INFLAMMATORIA febre vehementiori; pulsu duriore, celeri, nonnunquam vero humili, debili, sibi subobscura dissimili; dolore continuo, acuto, feroci, magis  
fixo,

fixo, tactu & post ingesta, acriori; rubore faciei; lingua sicca; excrementorum paucitate; vomitu crebriori & abdomine duro, tenso; tandem physiognomia mire mutata, oculis quasi exterefactis; interdum livore quodam circa labia stipata, cathartica minus fert. Venæ sectionem vero pro virium conditione repetitam exigit, simulque potum demulcentem, paregoricum, in quo, pro re nata, paucillum salis ammoniaci solvi potest; emulsionem cum camphora, mucilagine gummi arab. bene involuta, nitratas; decoct. hordei, rad. alth. cum flor. chamom. & gummi arab. clysteres similes crebriores, sed parvis portionibus aptos; externe pediluvia, ungt. de alth. cum camphor. & eff. Galbani mixtum, superinposito cataplasmate emoll. cum aqua vegeto-mineral. parato; nonnunquam vesicatoria temperata. Gangrenam manifestant dolorum subitanea remissio & dejectiones nigrae.

**DYSENTERIA MALIGNA** prostratione virium, anxietate summa; sensuum hebetudine; stupore; incuria; fœcum odore, fere cadaveroso, aliisque symptomatibus ominosis, insolitis, sibi contrariis, e. gr. delirio, cum calore parvo, calore magno absque siti &c. inprimis post moram in aëre corrupto & sub epidemia febrium putridarum continentium, subito invadentibus dignoscenda, rarissime v. s. interdum vero emeticum reiterandum, ad bilem putridam, turgentem, ex ventriculo & duodeno, & cathartica antiputredinosa, lenia, ad saburram ex reliquis intestinis eliminandam exigit, præmissa & interposito antiemetico Riverii vel haustu ex sale absynth.  $\supset$   $\beta$ .

&





& aceti bezoard. ℞. composito, sub actu effervescentiæ exhibendo. Id quod crebro sumtum, tutius vices evacuantium, in virium, ex causa magis nervosa, depreffione, noxiorum gerit. Hilce subjungenda antiseptica, roborantia, cardiaca, serum lactis vinosum, vel ope solutionis aluminis vitriolatæ Mülleri pptum, cum aqua destill. chamom. & rosar. mixtum; decoctum hordei cum cort. peruv. & cascarill. floribus chamom. & taleolis aurant. amar. & syrupo rosar. Berber. cinamomi pptum; juscula acidulata, emulsiones camphoratæ, mixtura simpl. spirit. Mindereri vel napha vitrioli crocata, moschata, aut R. rad. serpent. virg. contus. ℥j. spirit. vitriol. dulc. ℥j. digere in balneo mariæ per 2. horas, colat. adde oxym. simpl. ℥j. ms. & digere D. gttæ x-xx. ex aquis destill. meliss. rutæ, galeg. chamom. rosar. syrupo contrayervæ composito edulcoratis; fructus acaciæ in aceto macerati; miva aliaque præparata acidula cydoniorum; sinapismi; vesicatoria ad pedes &c. fomenta amara theriacalia ad abdomen; epithema antisepticum, cardiacum R. herb. scord. menth. summit. rutæ fol. rorismar. aa. Miss. cort. cinanom. peruv. nuc. myrist. aa. ℥ij. conc. contusa cum aceto rosar. & vino rhen. aa. ℥viii. coquantur in phiala alta vitrea per 1/8. horæ, liquori decantato adde aquæ prophylact. sylv. ℥ij. ms. s. hoc liquore imbutæ spongiolæ admoveantur scorbiculo cordis, axillis, carpis, naribus. Omnia vero cum grano salis adhibenda.

DYSENTERIA CHRONICA curatur evitando Csas occasionales & adhibendo ipecac. denique minoribus dosibus cum pulvere cort. simarub. & tantil-

tantillo opii mixtam; rheum tostum, subjunctis interdum opiatis; potum & clysteres demulcentes; juscula cum farina leniter & per se tosta, sem. carvi & N. M. ppta; trageam granorum aetes ad ℥j-℥ij. præparata ex quassia, cort. peruv. cascarill. simarub., elect. sub malo hypochondriaco descriptum; decoct. vel pulv. fol. Lyfimach. vel decoctum expertissimum ℞. Flor. lytri salicariæ rec. mj. si vero sicci sint ℥j. bulliant in aquæ vel hydrogalæ ℥viij colatura, per vices sumatur; vinum rubr. Pontack. acidul. martiales cum lacte.


DYSENTERIÆ EXULCERATÆ, *cacochoymicæ, dolorificæ a muco abraso, excoriatione curationem*, vide sub diarrhœa.


SYMPTOMATICA ex visceribus canerosis, putrefactis incurabilis est.


AD TENESMUM eathartica repetita; clysmata, mox tamarindinata, mox ex decocto saturato corticis peruv. sem. lini, fœnic. græc. capit. papav. floribus chamom. mucilage gumm. arab. liquamine verbasci aliisque lenientibus & antisepticis ppta (cannula vero, pulli intestinulo inverso, obvoluta sit) nec non infusus vaporosi; inprimis cataplasmata, ex lacte, croco, tantillo camphoræ &c. anum continuo comprimantia; quandoque venæ sectio.


AD RHEUMATISMUM DYSENTERICUM ubi, doloribus in extremitatibus cessantibus, statim colici dolores & diarrhœa oriuntur, parvæ doses hyec. cum opio, quibus rheum in refracta dosi sæpius interponatur.

















Raphael

~~Wolff~~ gläubiger Sohn von D. J. K. R.

Katholischer Brevier des heiligen

Kreuzes - Gesellschaft Mitteln



**BIBLIOTEKA**  
AKADEMII MEDYCZNEJ  
W LUBLINIE

**65**



